

Azilsartan Medoxomil

【OEDA】 Edarbi® 40mg/Tab

ATC Code : C09CA09

中文名： 易得平錠 «臺灣武田»

適應症： 治療高血壓。

藥理分類： **Angiotensin II Receptor Blocker; Antihypertensive.**

用法用量： **Administration:** orally, administer with or without food.

**Hypertension:**

Initial: 20~40 mg QD; may increase to 80 mg QD if necessary.

Max: 80 mg/day

不良反應： 暈眩、腹瀉、週邊水腫。

- 注意事項：
1. 可與食物或空腹服用。
  2. 避免經常食用含鉀代鹽。
  3. 若有經常咳嗽，應告知醫師。
  4. 2 週時可明顯見到接近最大程度的降壓效果，4 週時可達到最大效果。
  5. ≥75 歲高齡者可能有低血壓之風險，故可考慮以 20mg 為起始劑量。
  6. 輕度或中度腎功能不全病人無需調整劑量。
  7. 輕度或中度肝功能不全病人，應密切監測，可考慮以 20mg 為起始劑量。

- 交互作用：
1. Lithium: 兩者併用可能使鋰鹽血清濃度與毒性可逆增加。
  2. NSAID：可能降低降血壓效果，使腎功能惡化，升高血鉀濃度。
  3. 保鉀利尿劑、ACEI、 ARB、鉀補充劑、含鉀食鹽替代品：升高血鉀濃度。

- 懷 孕 期：
1. 禁止使用。
  2. **[US Boxed Warning]: Drugs that act on the renin-angiotensin system can cause injury and death to the developing fetus. When pregnancy is detected, discontinue as soon as possible.**
  3. The use of angiotensin II receptor blockers is generally not recommended to treat chronic hypertension in pregnant women and should generally be avoided in women planning a pregnancy (ACOG 203 2019).

授 乳 期： 由於缺乏哺乳期間使用 Edarbi®的資訊，故哺乳時不建議使用 Edarbi®，建議改用其他安全性較確立的藥物，尤其是為新生兒或早產兒哺乳期間。