

Prasugrel HCl

【OEF3】Efient® Tab 3.75mg/Tab

ATC Code : B01AC22

中文名：抑凝安膜衣錠 3.75 毫克 «台灣第一三共»

適應症：適用於需要冠狀動脈介入性治療(PCI)的急性冠狀動脈症候群(ACS；不穩定型心絞痛[UA]、非 ST 段上升之心肌梗塞[NSTEMI]或 ST 段上升之心肌梗塞[STEMI])。

藥理分類：Antiplatelet Agent, Thienopyridine; P2Y12 Antagonist.

用法用量：起始劑量：為單次使用 20mg 口服劑量，

維持劑量：3.75mg QD。

NOTE:

1. 應合併 aspirin 使用(81 - 100 mg/天，起始劑量最多為 324mg)
2. 在進行 PCI 之前，已經接受 Efient 3.75 mg 劑量約 5 天的病患，不需要使用起始劑量(即治療第一天的起始劑量 20mg)。(Efient 所引發的血小板凝集抑制作用，預計會在 5 天內達到穩定狀態。)
3. 不建議於空腹情況下使用 Efient (使用起始劑量時除外)。空腹狀態相較於飽足狀態用藥會有較高的最高血中濃度(Cmax)。

不良反應：出血相關反應(如鼻出血、牙齦出血等)、皮疹、貧血、肝功能異常。

交互作用：1. Aspirin: ↑ risk of bleeding.
2. warfarin、heparin 和 edoxaban: ↑ 抗血栓的作用。
3. NSAIDs (如 loxoprofen 和 naproxen): ↑ 抗血栓的作用。

注意事項：1. 不建議於空腹情況下使用 Efient (使用起始劑量時除外)。
2. 請留意起始劑量和 aspirin 併用時，可能會增加出血的風險。
3. Efient 所引發的血小板凝集抑制作用，可能會對要接受手術的病患造成問題，建議臨床醫師在術前至少 14 天停止使用 Efient。
4. 下列病人應謹慎使用：重度肝功能不全、重度腎功能不全、血壓持續偏高、年長病患(年齡≥ 75 歲)、體重偏低(<50kg)、具有腦梗塞或暫時性腦缺血(TIA)病史。

懷孕期：1. 只有在預期的治療效益高於可能的風險時，才建議懷孕和可能懷孕的女性使用 Efient。
2. Adverse events have not been observed in animal reproduction studies. Information related to use during pregnancy is limited (Tello-Montoliu 2013).

授乳期：1. 哺乳母親在服用 Efient 時應避免授乳。Efient 代謝物會分泌至大鼠的乳汁中。
2. It is not known if prasugrel is excreted in breast milk.
3. The decision to continue or discontinue breast-feeding during therapy should take into account the risk of infant exposure, the benefits of breast-feeding to the infant, and benefits of treatment to the mother.

健保規定：限用於需要冠狀動脈介入性治療(PCI)的已發作之急性冠心症(包括不穩定型心絞痛、非 ST 段上升型心肌梗塞或 ST 段上升型心肌梗塞)而住院的病人時，得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併治療，最長 12 個月。需於病歷註明住院時間。