

## Venlafaxine

【OEFE3】37.5mg Efexor XR (Efexor XR®) 37.5mg/Cap

ATC Code : N06AX16

中文名：速悅持續性藥效膠囊 «Pfizer»

適應症：鬱症，泛焦慮症、社交焦慮症。

用法用量：Initially, 75 mg once daily with meal; may increase dosage by 75 mg/day increments every 4 days to a MAX dose of 225 mg/day.

不良反應：噁心、頭痛、嗜睡、口乾、便秘、暈眩、失眠、神經緊張、盜汗。

交互作用：並用 MAOIs 或 TCAs，易發生類精神病症狀的惡性症候群(體溫過高、肌陣攣...)。

注意事項：

- 1、使用 Efexor® 治療時，可能會導致血壓持續性升高，因此要監測病人的血壓。
- 2、本劑絕對禁止與 MAOIs 合併使用，須在 MAOIs 停用 2 週之後，才可使用。
- 3、建議中度腎功能損壞的病患將全日劑量降低 25%，而中度肝功能損壞或血液透析的病患，將全日劑量降低 50%。
- 4、回溯性臨床研究報導指出，相較於其他 SSRI 抗憂鬱藥品，venlafaxine 的用藥過量可能有較高的致死危險性，但其危險性仍比三環類抗憂鬱藥品來的低。建議醫療專業人員開立 venlafaxine 處方時，能一次給予病患最小量的膠囊數，並給予病患良好的教育與管理，來減低用藥過量的危險性。

授乳期：病患若要哺乳嬰兒，應告知醫師。

\*\*全民健保藥品給付規定：使用時須符合衛生主管機關核准之適應症，病歷上應詳細註明診斷依據及使用理由。