Estazolam

【OEUR】Eurodin（Eszo®）2mg/Tab *ATC Code：N05CD04*

中 文 名： 艾斯樂錠 «信東»

適 應 症： 失眠。

藥理分類： **Benzodiazepine.**

用法用量： **Administration:** Orally, taken immediately before bedtime.

Dosage regimen:
Usual dose: adults, 1-2 mg HS.

Dose adjustments:
－Debilitated patients: 0.5 mg HS, may increase dose as needed and tolerated.
－Geriatrics: 1 mg HS, may increase dose as needed and tolerated.

禁 忌： 孕婦及對 Estazolam 過敏者禁用。

不良反應： 嗜睡、頭昏、口渴、便秘。警覺性及動作協調能力降低等。

交互作用：

- **FLUMAZENIL**: May result in precipitation of seizures.
- **PHENOBARBITAL**: ↑ risk of CNS and respiratory depression.
- **BUPRENORPHINE**: ↑ risk of CNS depression and respiratory depression.

注意事項： 1.睡前服用。
2.服藥期間應避免心開車或操作危險機械。
3.可能出現夢遊行為,如開車、打電話及準備與食用食物。

懷 孕 期： 1. 安全性尚未建立。除非沒有更安全的代替方法，懷孕期間不建議使用本藥。
2. 在懷孕的最後三個月給予其他 benzodiazepines，有報告指出胎兒的心跳不規則、新生兒出現肌張力過弱、吸吮力不足、黃疸等。
3. 母體若於懷孕後期階段長期接受 benzodiazepines，嬰兒可能會發展出生理依賴性，且在產後期間也可能發展出戒斷症狀的危險性。

授 乳 期： 本品用於授乳婦時，其對嬰兒的安全性尚未確立。