

Cevimeline HCl

【OEVOA】 Evoxac[®] 30mg/Cap

ATC Code : N07AX03

中文名： 愛我津膠囊 《台灣第一三共》

適應症： 治療 Sjogren's Syndrome 所引起得口乾症狀。

藥理分類： **Cholinergic Agonist.**

用法用量： **Administration:** orally, taken with or without food.

Indications and dosage regimens:

Dosage regimen:

Xerostomia (in Sjögren's syndrome):

30 mg TID

不良反應： 出汗、噁心、鼻炎、腹瀉、頭痛。

注意事項：

- 1.可於飯前或飯後服用。
- 2.應補充足夠水分〈需限制水分攝取之患者除外〉。
- 3.夜間開車或在光線不足下從事危險性活動時，必須特別小心。
- 2.不可使用於氣喘控制不良或已知對 cevimeline 過敏的病人。
- 3.不宜用在發生瞳孔收縮的病患，例如發生急性虹膜炎與狹角型青光眼患者。

懷 孕 期：

- 1.安全資料不足。須考量對孕婦的益處及對胎兒的潛在風險。
2. Adverse effects were observed in animal reproduction studies.

授 乳 期：

目前還尚未知此藥物是否會分泌至人乳汁中。但因為許多藥物都可能分泌至人乳中，所以 cevimeline 可能會對哺乳中的嬰兒引發嚴重的副作用，因此必須先考量此藥對母親的重要性再決定是否要停止授乳或停藥。