

Febuxostat

【OFEU】Feuri® F.C. Tab 80mg/Tab

ATC Code : M04AA03

中文名：飛悅膜衣錠 «中化裕民»

適應症：治療慢性痛風患者的高尿酸血症。不建議用於無症狀的高尿酸血症者。

藥理分類： **Antigout Agent; Xanthine Oxidase Inhibitor.**

用法用量： **Note:** It is recommended to take an NSAID or colchicine with initiation of therapy and may continue for up to 6 months to help prevent gout flares. If a gout flare occurs, febuxostat does not need to be discontinued.

Administration: orally, taken with or without food.

Dosage regimen:

Hyperuricemia:

Initial: 40 mg once daily; may increase to 80 mg once daily in patients who do not achieve a serum uric acid level < 6 mg/dL after 2 weeks.

The dose may be increased further to 120 mg once daily if clinically indicated (ACR guidelines [Khanna, 2012]).

不良反應： 皮疹、噁心、關節痛、肝指數上升。

交互作用：

- AzaTHIOprine: Febuxostat may increase the serum concentration of AzaTHIOprine. Risk X: Avoid combination.
- Mercaptopurine: Febuxostat may increase the serum concentration of Mercaptopurine. Risk X: Avoid combination.
- Didanosine: Febuxostat may increase the serum concentration of Didanosine. Risk X: Avoid combination.

注意事項： 1. 空腹或與食物一起服用皆可。
2. 服藥期間若發生尿色變深，皮膚或眼睛變黃、食慾嚴重不佳、或感覺極為乏力、右上腹不適或嚴重皮疹等之情形請立即就診。
3. 正在使用 azathioprine 或 mercaptopurine 的患者禁用 Febuxostat。

懷 孕 期： 對懷孕婦女並未進行適當且有良好對照的試驗。潛在效益超過對胎兒的潛在風險時方可使用。

授 乳 期： Febuxostat 會分泌至大鼠乳汁中。不知道此藥是否會分泌至人類乳汁中。因為許多藥物會分泌至人類乳汁中，所以當 Febuxostat 用於哺乳婦女應小心。

使用規定： 限慢性痛風患者之高尿酸血症使用，且符合以下條件之一：

1. 曾使用過 benzbromarone 治療反應不佳，尿酸值仍高於 6.0 mg/dL。
2. 患有慢性腎臟病 (eGFR < 45 mL/min/1.73m² 或 serum creatinine ≥ 1.5mg/dL)，或具尿酸性腎臟結石或尿酸性尿路結石，或肝硬化之痛風病人。