

Fludiazepam

【OFLUP】 Flupine® 0.25mg/Tab

ATC Code : N05BA17

中文名： 福安源錠 «強生»

適應症： 焦慮狀態、失眠、肌肉痙攣。

藥理分類： **Benzodiazepines.**

用法用量： **Administration:** orally, taken without regard to meals.

Dosage Regimen:

Adults, 0.25 mg TID.

不良反應： 嗜睡、依賴性、刺激、興奮、便秘、口渴、胃腸道不適等。

交互作用：

- Phenthiazine 類、Barbiturate 等的中樞神經抑制劑，有增強其作用之慮，此等場合時希望不要投與，不得不投與時須慎重投與之。
- 攝取酒精患者，會增強中樞神經抑制作用，此等場合時希望不要投與，不得不投與時須慎重投與之。

注意事項： 1.空腹或與食物一起服用皆可。
2.服藥期間應避免心開車或操作危險機械。
3.急性窄角青光眼患者與重症肌無力症患者禁用本品。
4.小兒、呼吸道疾病、心臟疾病、肝臟功能障礙者須謹慎使用。

懷 孕 期： 安全性尚未建立，不建議使用。

授 乳 期： 可能引起新生兒嗜睡，體重減少及增強黃疸的可能性，故授乳婦應避免之，不得不投與時則避免授乳。