

Flavoxate HCl

【OFOX】 Foxate® 200mg/Tab

ATC Code : G04BD02

中文名：伏順膜衣錠 200 毫克 «萬海藥業»

適應症：神經性頻尿、慢性前列腺炎、慢性膀胱炎之頻尿、殘尿感。

藥理分類：Antispasmodic Agent, Urinary.

用法用量：**Administration:** Orally Taken without regard to meals.

Dosage regimens:

Adults & children > 12 years:

100-200 mg 3-4 times per day; may reduce dose with improvement of symptoms.

不良反應：頭痛、神智混亂、噁心、嘔吐、複視、思睡、心跳加速、便秘、心悸。

交互作用：

- **Ipratropium (Oral Inhalation):** ↑ the anticholinergic effect of Anticholinergic Agents. Risk X: *Avoid combination.*
- **Tiotropium:** ↑ the anticholinergic effect of Tiotropium. Risk X: *Avoid combination.*
- **Potassium Chloride:** ↑ the ulcerogenic effect of Potassium Chloride. Management: Patients on drugs with substantial anticholinergic effects should avoid using any solid oral dosage form of potassium chloride. Risk X: *Avoid combination.*
- **Potassium Citrate:** ↑ the ulcerogenic effect of Potassium Citrate. Risk X: *Avoid combination.*

- 注意事項：
1. 空腹或與食物一起服用皆可。
 2. 幽門及十二指腸阻塞、胃腸出血、下尿道泌尿器阻塞之患者禁用本劑。
 3. 青光眼之患者應小心使用本劑。
 4. 本劑不建議使用於 12 歲以下孩童。

- 懷 孕 期：
1. 動物試驗顯示對胎兒或孕婦無害。
 2. 若需服用本藥，懷孕前三個月需特別小心。
 3. Adverse events have not been observed in animal reproduction studies.

- 授 乳 期：
1. 尚不知 Flavoxate 是否會分泌至乳汁。
 2. It is not known if flavoxate is excreted in breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering flavoxate to nursing women.

貯 存：置於緊密、避光的容器中，貯存於 30°C 以下。