

Flupentixol

【OFUT】Fute (Fute®) 0.5mg/Tab

ATC Code : N05AF01

中文名： 安平靜膜衣錠 《東竹》

適應症： 精神病狀態，治療憂鬱症(短期使用)。

用法用量： **Administration:**

- taken with or without food.
- During initial therapy, may consider reducing evening dose in patients with sleep disturbance.
- Maintenance dose may be given as single morning dose.
- Missed doses should be taken at the next regularly scheduled time.

Indications and dosage regimens:

Schizophrenia:

Initial: 1 mg 3 times/day; dose must be individualized. May be increased by 1 mg every 2-3 days based on tolerance and control of symptoms.

Maintenance dosage: 3-6 mg/day in divided doses (doses $\geq$ 12 mg/day have been used in some patients).

(仿單) 成人：

- 初劑量，每日早晨服用一毫克或每天兩次，每次 0.5 毫克。經一星期後，若無適當的臨床反應，則可將劑量增至每日二毫克。
- 每日最大劑量超過二毫克時應分次給藥，最大劑量可增至三毫克，服用本品 2-3 天後即可產生療效；
- 若每天服用劑量達三毫克，於一星期內尚未產生療效，則必須停藥。

不良反應： 暈眩、視覺異常、失眠、精神亢奮、思睡、唾液增加、噁心／嘔吐、便秘、口乾、下痢、體重增加、疲勞。

注意事項：

- 易激動或過於活躍的病人，劑量不建議使用到 25 毫克/天，因其活化作用會導致這些症狀惡化。
- Flupentixol 可能改變 insulin 與葡萄糖之反應，必須調整糖尿病患者使用抗糖尿病藥物。

交互作用：

- 可能增加或減少抗高血壓藥物之療效。
- 與鋰鹽併用時會增加神經毒性的危險。
- 三環抗抑鬱劑及抗精神病藥物會相互抑制其代謝作用。
- Flupentixol 可能會減少 Levodopa 及 Adrenergic 藥物之療效。
- 與 etoclopramide 及 Piperazine 併用時會增加產生錐體外症候群之危險。
- **Azelastine (Nasal):** ↑ CNS depressant effect. Avoid combination.
- Glycopyrronium (Topical, oral inhalation), Ipratropium (Oral Inhalation): ↑ the anticholinergic effect. Avoid combination.
- **Metoclopramide :** ↑ the adverse/toxic effect of Antipsychotic Agents. Avoid combination.
- **Potassium Citrate, KCl:** ↑ the ulcerogenic effect of Potassium Chloride/citrate. Avoid combination.
- **Sulpiride:** ↑ the adverse/toxic effect of Sulpiride. Avoid combination.
- **Lithium:** ↑ the neurotoxic effect of Flupentixol. Lithium may ↓ the serum concentration of Flupentixol.

懷 孕 期： 孕婦不應投與 Flupentixol，除非對病人所預期之益處遠超過對胎兒理論上的風險。

授 乳 期： 當投與治療劑量時，在乳汁中會發現低濃度 Flupentixol 之存在，其不會影響嬰兒。嬰兒攝入之量低於母親每日劑量之 0.5%。若考慮臨床的重要性，以 Flupentixol 治療時可以繼續哺乳，但是建議觀察嬰兒，尤其是在出生後之前四週。