

Racecadotril

【OHID】Hidrasec® 10 mg/sachet

ATC Code : A07XA04

中文名： 嬰兒瀉必寧懸浮液用顆粒劑 《亞培》

適應症： 適用於嬰兒(3 個月以上)及兒童當口服補充液體及一般支持療法不足以控制臨床狀況之輔助性急性腹瀉症狀治療。

藥理分類： Enkephalinase Inhibitor.

用法用量： **Administration:** orally, taken mixed with food or small amount of water.

**Dosage:**

Infants (>3 months) and children:

The recommended dose is determined according to body weight: 1.5 mg/kg per dose (corresponding to 1 to 2 sachets), three times daily at regular intervals.

不良反應： 少見。皮膚出疹、紅斑。

注意事項： 1.此顆粒劑可加入食物中或少量水( 如置於茶匙中) 充分混合後立即服用。  
2.兒童之建議劑量每次最高不應超過 60 mg。  
3.患有糖尿病患者，應考慮每一小包中蔗糖之含量；每包 10 毫克顆粒劑含有 0.966 公克的蔗糖 (sucrose)。若每日劑量中所含之蔗糖 (葡萄糖和果糖的來源) 的量超過每日 5 克，每日糖的攝取比例應將此考慮進去。  
4.本品不能使用在小於 3 個月大的嬰兒，因為沒有針對此族群的臨床研究。  
5.由於可能降低生體可用率，本品不應使用於發生延長或無法控制的嘔吐情況。

懷 孕 期： Racecadotril 不應使用於懷孕婦女。Racecadotril 未有使用在懷孕婦女之足夠數據。動物試驗未顯示直接或間接對懷孕、胎兒生長、分娩或胎兒出生後成長有害。

哺 乳 期：本品不應使用在授乳婦女。尚未知 Hidrasec® 是否會被分泌至乳汁。

健保規定： 每療程使用不得超過 5 天。

備 註： 委員會決議此品項系統鎖住限 12 歲以下使用。