

Sumatriptan Succinate

【OIMIG】Imigran FDT (Imigran FDT®) 50mg/Tab

ATC Code : N02CC01

中文名：英明格速溶錠 «GSK»

適應症：有先兆或無先兆偏頭痛發作之急性緩解。本藥僅適用於有明確診斷之偏頭痛。

用法用量：本品不宜作預防性使用

Safety and efficacy not established in pediatric patients. 25, 50, or 100 mg as a single dose. Individualize dosage selection, weighting the possible benefit (greater effectiveness) and risks (increased adverse effects) of the 50- or 100- mg dose; 100-mg dose may not provide substantially greater effect than 50- mg dose.

If headache recurs or partial response occurs after initial dose, additional doses may be administered at intervals of ≥ 2 hours, up to a maximum dosage of 200 mg daily.

不良反應：噁心、嘔吐；睏倦、胸部或頸部疼痛、視力改變；心跳變快；呼吸困難、哮喘；皮疹；肌肉麻痺等。

一級互斥：Sumatriptan 與 ergot 衍生物（如 Seglor®）並用，會導致血管痙攣反應延長。

注意事項：1、Imigran® FDT 不可用於嚴重肝功能不全的患者。

2、Imigran® FDT 不得使用於曾患有心肌梗塞、缺血性心臟病、Prinzmetal 氏狹心症、冠狀血管痙攣者及高血壓未受控制的患者。

3、Imigran® FDT 不可並用含有 ergotamine 之製劑或其衍生物（在給予任何含有 ergotamine 製劑後至少 24 小時才能再給予 Imigran® FDT；給予 Imigran® FDT 至少 6 小時後，才能再給予含有 ergotamine 製劑。）

4、Imigran® FDT 不可並用 MAOI，必須在 MAOI 停藥 2 週後方可使用 Imigran®。

5、Imigran® FDT 的治療可能會導致嗜睡，從事技術性工作的患者應特別小心。

6、Imigran® FDT 錠劑需整顆以水吞服。

授乳期：授乳婦避免在服藥後 24 小時內哺育嬰兒，可降低嬰兒接觸該藥的機會。

※全民健保藥品給付規定：

1、限符合國際頭痛協會（International Headache Society）一九八八年訂定的「偏頭痛」診斷標準者：

(1)至少有五次能符合(2)至(4)項的發作。

(2)頭痛發作持續四至七十二小時。

(3)頭痛至少具下列二項特徵：

I.單側

II.搏動性

III.程度中等或重度（日常生活受限制甚或禁絕）

IV.上下樓梯或類似之日常活動會使頭痛加劇

(4)當頭痛發作時至少有下列一情形：

I.噁心或嘔吐

II.畏光及怕吵

2、偏頭痛之發作嚴重影響日常生活（無法工作或作家事或上課）者。

3、經使用其他藥物無效者。

4、每月限用四次，且

(1)Sumatriptan succinate 口服劑型藥品每次用量不超過 100 mg，每月不超過 400 mg。

(2)Sumatriptan succinate 鼻噴劑型藥品每次用量不超過一劑（10 mg 或 20 mg），每月

不超過四劑（10 mg 或 20 mg）。

(3) Rizatriptan 口服劑型藥品每次用量不超過 10 mg，每月不超過 40 mg。

- 5、不得同時處方含有 ergotamine 製劑或其衍生物類藥物。
- 6、不得作為預防性使用。
- 7、不得使用於曾患有心肌梗塞、缺血性心臟病、Prinzmetal 氏狹心症、冠狀血管痙攣者及高血壓未受控制的患者。
- 8、青少年符合上述第 1、2、3 項者，限使用鼻噴劑型藥品。