

Cephalexin Monohydrate

【OKEFI2】250mg Ikodin® 250mg/Cap

ATC Code : J01DB01

中文名：伊克定膠囊 «瑞士»

【OKEF5】500mg Cephalexin® 500mg/Cap

ATC Code : J01DB01

中文名：賜福力欣膠囊 «信東»

【OKEF5】Ulexin® for Oral Suspension 25mg/mL, 60mL/Bot

ATC Code : J01DB01

中文名：優力黴素口服懸液用顆粒 «優良化學»

適應症：葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

藥理分類：Antibiotic, Cephalosporin (First Generation).

用法用量：**Administration:** orally without regard to meals.

When daily doses > 4 g are required, parenteral cephalosporins should be considered.

Indications and dosage regimens:

Cystitis, uncomplicated:

500 mg Q12H; up to 4 g/day.

Treatment of cystitis should be administered only to adults and adolescents \geq 15 years old and should continue for 7-14 days.

Pharyngitis/Skin & soft tissue infections /Tonsillitis:

— Adults & children > 40 kg:

500 mg Q12H; up to 4 g/day.

— Children \geq 1 yr, and \leq 40kg: 12.5-25 mg/kg Q12H.

Otitis media:

— Children > 40kg: 500 mg Q12H; up to 4 g/day.

— Children \geq 1yr, and \leq 40kg: 18.75-25 mg/kg Q6h.

For all other infections:

— Adults & children > 40 kg:

Mild to moderate: 250 mg Q6h.

Severe: up to 1 g Q6h.

— Children:

\geq 1 yr, and \leq 40 kg:

Mild to moderate: 12.5-25 mg/kg Q12h; or 6.25-12.5 mg/kg Q6h.

Severe: 25-50 mg/kg Q12h; or 12.5-25 mg/kg Q6h.

Infants & children 1 month to 1 year:

6.25-12.5 mg/kg Q6h.

不良反應：過敏性反應、腹瀉、胃腸障礙。

注意事項：1.曾有胃腸疾病，特別是潰瘍性結腸炎，區域性腸炎或與抗生素有關的腸炎、腎臟功能不全者須審慎使用。

2.Ulexin®使用前須加冷開水至 60 mL，搖勻後使用。未用完之部分可放置冰箱冷藏，保存 7 天。如剩餘部份經冷藏保存超過 7 天，應予丟棄勿使用。

懷 孕 期：本劑對孕婦的安全性尚未確定。小心使用。

授 乳 期：本劑對哺乳婦的安全性尚未確定。小心使用。

**全民健保醫療常用第一線抗微生物製劑。