

Ketosteril

【OKET】Ketosteril Tab

ATC Code : V06DD

中文名：吉多利錠《費森尤斯卡比》

適應症：慢性腎不全時氨基酸之補給。

藥理分類：Amino acids

藥理作用：Ketosteril 包含五種必需胺基酸(Essential Amino Acid)和五種必需胺基酸的 α -酮酸(α -Keto Acid)， α -酮酸在化學結構上類似胺基酸，但是不含胺基；在體內可以經由轉氨作用結合蛋白質代謝後的產物-含氮廢物，再利用轉化成相當的必需胺基酸；因此減少體內尿毒的含量，降低了含氮廢物經過腎臟的排泄，不但幫助改善尿毒症的症狀並且減輕腎臟的負擔。

主 成 分：每一錠含

Calcium-3-methyl-2-oxo-valerate 67mg
(α -Ketoanalogue to isoleucine, Calcium salt)
Calcium-4-methyl-2-oxo-valerate..... 101mg
(α -Ketoanalogue to Leucine, Calcium salt)
Calcium-2-oxo-3-phenylpropionate 68mg
(α -Ketoanalogue to Phenylalanine, Calcium salt)
Calcium-3-methyl-2-oxo-butyrate..... 86mg
(α -Ketoanalogue to Valine, Calcium salt)
Calcium-DL-2-hydroxy-4-(methyl-thio)-butyrate 59mg
(α -Hydroxyanalogue to Methionine, Calcium salt)
L-Lysine-acetate (=75 mg L-Lysine)..... 105mg
L-Threonine..... 53mg
L-Tryptophan..... 23mg
L-Histidine..... 38mg
L-Tyrosine..... 30mg
Total nitrogen content/tablet..... 36mg
Calcium/tablet.....1.25mmol=0.05g

用法用量：Administration: 用餐中服用。

Dosage: 70 公斤成人

4~8 Tab Tid

不良反應：偶有高血鈣。

交互作用：

- 避免同時服用可能與鈣形成複合物的藥物，如 Tetracycline。
- Calcium Polystyrene Sulfonate: ↓ effectiveness. of Calcium Polystyrene Sulfonate.
- Digoxin: may result in a serious risk of arrhythmia and cardiovascular collapse.
- Baloxavir (Xofluza): ↓ baloxavir concentration.
- Levofloxacin: ↓ oral levofloxacin effectiveness.
- Ciprofloxacin: ↓ oral ciprofloxacin efficacy.
- Norfloxacin: ↓ oral norfloxacin efficacy.
- Doxycycline: ↓ effectiveness of oral tetracyclines.
- Iron: ↓ the absorption of Iron Preparations.

注意事項：

1. 不建議高血鈣、胺基酸代謝紊亂者使用。
2. 配合醫師指示，限制每天蛋白質攝取量。
3. 使用後減輕尿毒症症狀，應減少氫氧化鋁劑量。
4. 須監測血清磷酸鹽濃度(可能減低)。
5. 若發生高血鈣，須減少維生素 D 劑量及含鈣物質攝取。

懷 孕 期：因尚無足夠之孕婦使用本製劑的相關報告。

授 乳 期：尚無用於哺乳婦女之相關報告。

儲 存：於室溫(勿高於 25°C)乾燥處儲存。