

Lactitol monohydrate

【OLAC】Speedon® Powder 10g/包

ATC Code : A06AD12

中文名：舒必通粉劑 «南光»

適應症：便秘、急慢性肝性腦病變。

藥理分類：Ammonium Detoxicant; Laxative, Osmotic.

用法用量：Administration: Orally, preferably mixed with food.

Dosage regimens:

Constipation:

— Adults: Initial, 20 g with breakfast or the evening meal for first 4-5 days.

Maintenance dose: 10 g/day.

The dose should be adjusted to obtain one stool daily.

— Children: 0.25 g/kg/day.

Chronic or acute portal -systemic encephalopathy:

— 0.5-0.7 g/kg/day, in 3 divided doses.

This dose is reduced or increased to obtain two soft stools daily.

不良反應：脹氣、腹痛、腹部痙攣、噁心、腹瀉、肛門搔癢。

注意事項：

- 1.可與食物或飲料一起服用，服用後再飲用 200-400mL 液體飲料。
- 2.腸道閉塞、水分/電解質不平衡、腹瀉病人不宜使用。
- 3.作為治療肝性腦病變時，不可併用制酸劑或 neomycin。
- 4.併用 thiazide、corticosteroid、amphotericin B 會加速鉀離子流失。

懷 孕 期：無安全性相關資料。

授 乳 期：無安全性相關資料。