

Carbidopa 25mg, Levodopa 100mg
【OLEC】Lecadopa® 25/100 Tab

ATC Code : N04BA02

中文名：克帕樂 25/100 錠 《瑩碩生技》

適應症：帕金森氏症及綜合病症（肌肉強直及運動遲緩、震顫、流涎、吞嚥困難及姿勢不穩）。

成分： Each tablet contains:
Carbidopa 25 mg
Levodopa 100 mg

藥理分類： **Anti-Parkinson Agent, Decarboxylase Inhibitor; Dopamine Precursor.**

用法用量： **Administration:** Administer with meals to decrease GI upset.

Parkinsonian syndrome:

- Initial, 1 tab TID; increase by 1 tablet daily or every other day to 8 tablets daily.
- Maintenance, individualize; minimum of 70-100 mg carbidopa daily to minimize nausea and vomiting, MAX 200 mg carbidopa (8 tablets) daily.
- Conversion from levodopa monotherapy, levodopa should be discontinued at least 12 hr prior to initiation of treatment with carbidopa/levodopa, which daily dose should be 25% of the previous levodopa dosage.

Restless legs syndrome:

1 tablet once daily at bedtime, may repeat dose if awakening within 2 hr.

不良反應： 食慾降低、噁心、嘔吐、動作障礙或困難、頭暈、失眠、做惡夢、幻覺、精神混亂等。

交互作用：

- 若與降壓藥合併使用時，容易發生姿勢性低血壓的情形，故需調整劑量。
- 與 TCA 或 MAOI(MAO-B inhibitor)等抗抑鬱劑合併使用，曾發生高血壓及運動困難。
- PHENYTOIN: ↓ levodopa effectiveness.
- LINEZOLID, METHYLENE BLUE: may result in hypertensive crisis.
- SULPIRIDE, METOCLOPRAMIDE: ↓ efficacy of either drug.
- HALOPERIDOL: loss of antiparkinson efficacy.
- ISONIAZID: may result in symptomatic deterioration of Parkinson's disease.
- IRON: ↓ carbidopa or levodopa effectiveness.
- HIGH PROTEIN FOOD: ↓ levodopa concentrations.

注意事項： 1. 建議與食物一起服用以減少腸胃副作用。需要時，本錠劑可以剝半使用。
2. 服藥後尿液可能變深色。
3. 服藥期間，避免由躺臥或坐姿突然站起來，以免造成暈眩。
4. 服藥期間，避免長途開車及操作危險器械。

禁忌： 1.不可與無選擇性的 MAOI 合併使用，須於本劑開始治療前兩週停用 MAOI。
2.不可用於閉鎖性青光眼的患者。
3.不建議用於藥物引起的錐體外反應。

懷孕期： 須衡量本藥品帶來的益處與可能的風險。

授乳期： 尚未知 levodopa / carbidopa 是否會分泌至乳汁中。

使用規定： 全民健保--

- 1.如病人開始出現功能障礙，在使用 levodopa 之前或同時，得使用一種 dopamine agonist (ropinirole、pramipexole、pergolide、lisuride 及 rotigotine) ，或 amantadine，或是 levodopa 併用 COMT 抑制劑 (entacapone：如 Comtan film-coated tab.) 。
- 2.若已同時使用上述藥物且達高劑量，仍無法達到滿意的 "on" state，或出現運動併發症 (如異動症或肌強直) ，需合併使用多類藥物治療時，應於病歷上詳細記載理由。