

Lenvatinib mesylate

【OLEN10】(自費) Lenvima[®] 10mg/Cap

ATC Code : L01XE29

中文名：樂衛瑪膠囊 10 毫克 «衛采製藥»

適應症：1.分化型甲狀腺癌。 2.腎細胞癌。 3.肝細胞癌。 4.子宮內膜癌。

藥理分類：**Antineoplastic Agent, Tyrosine Kinase Inhibitor; Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Inhibitor.**

用法用量：**Administration:**

- Orally taken at the same time each day, with or without food.
- Capsules may be swallowed whole or dissolved in a small glass of liquid.
 - ◇ To dissolve in liquid, measure 15 mL of water or apple juice into a glass; add whole capsule (do not break or crush capsule) and leave in liquid for at least 10 minutes, then stir for at least 3 minutes.
 - ◇ Administer liquid, then add 15 mL of additional water or apple juice to glass, swirl a few times and then swallow additional liquid.

Indications and dosage regimens:

Thyroid cancer differentiated:

24 mg QD until disease progression or unacceptable toxicity.

Renal cell carcinoma, advanced:

18 mg QD (in combination with 5mg everolimus),
continue until disease progression or unacceptable toxicity.

Hepatocellular carcinoma, unresectable:

12 mg QD (patients ≥ 60 kg [actual body weight]) or
8 mg QD (patients < 60 kg [actual body weight]);
continue until disease progression or unacceptable toxicity.

Endometrial carcinoma, advanced:

20 mg QD (in combination with pembrolizumab), continue until disease
progression or unacceptable toxicity.

Dosing: Renal Impairment:

Preexisting renal impairment:

CrCl ≥ 30 mL/minute: No dosage adjustment necessary.

CrCl < 30 mL/minute:

Thyroid cancer, differentiated: 14 mg QD.

Renal cell cancer, advanced: 10 mg QD.

Dosing: Hepatic Impairment: Adult

Preexisting hepatic impairment:

Severe impairment (Child-Pugh class C):

Thyroid cancer, differentiated: 14 mg QD.

Renal cell cancer, advanced: 10 mg QD.

不良反應：高血壓、疲勞、腹瀉、食慾減退、噁心、嘔吐關節痛/肌痛、體重減輕。

交互作用：1. 在基期及治療期間須定期監測和矯正電解質異常。對於有先天性 QT 間隔延長症狀、鬱血性心衰竭、緩脈性心律不整和使用已知會延長 QT 間隔之藥物(包括 Ia 類和 III 類抗心律不整藥物)病人須監測心電病人須監測心電圖。2. 視嚴重程度，暫停使用 Lenvima，恢復後，降低劑量繼續 Lenvima 治療。

注意事項：1. 此藥物為膠囊劑型，應整粒吞服。
2. 不方便吞服膠囊的患者，可將膠囊放入一大湯匙的水或蘋果汁中(膠囊不需打開或壓碎)，以溶解於液體。將膠囊靜置於水或蘋果汁中至少 10 分鐘，再攪拌至少 3 分鐘。飲用混合液後，再加入一大湯匙的水或蘋果汁於玻璃杯中，

攪勻後再飲用完水或蘋果汁。

3. 如忘記服藥時，想起應立刻補一次劑量，若是離下次服藥時間不到 12 小時，則跳過忘記的劑量，不可同時服用兩倍。

- 懷孕期：**
1. 懷孕婦女使用 Lenvima[®]會對胎兒造成傷害。對於藥物相關的風險，目前無人體試驗數據。
 2. 有生育能力的婦女於 Lenvima[®]治療期間及服用最後一個劑量後至少 30 天應採取有效之避孕措施。
- 哺乳期：**
1. Lenvima[®]尚未知是否會分泌於人類乳汁中。
 2. 因為 Lenvima[®]可能對哺餵之嬰兒造成嚴重不良反應，須告知婦女使用 Lenvima[®]治療期間及服用最後一個劑量後至少 1 周需停止哺乳。