

Lacidipine

【OLES6】 Lesyn[®] F.C. 6mg/Tab

ATC Code : C08CA09

中文名： 樂壓定膜衣錠 «健喬信元»

適應症： 高血壓。

藥理分類： **Calcium Channel Blocker, a lipophilic dihydropyridine.**

用法用量： **Administration:** orally, taken at the same time each day, with or without food.

Dosage regimen:

Hypertension:

Initial: 2 mg QD, preferably in the morning;
may increase dose in increments of 2 mg typically every 3 to 4 weeks.
Maximum: 6 mg QD

不良反應： 頭痛、潮紅、眩暈、水腫、心悸。

注意事項： 1.飯前或飯後皆可。每天必須在同一時間服用，最好在早晨服用。
2.本藥用於最近發生過心肌梗塞的患者應小心。
3.不可與葡萄柚汁一起服用。
4.如果必須服用半粒的劑量，剩下的半粒錠必須存放在原始的鋁箔包裝內(避光)，並於 48 小時之內使用。

交互作用： 1. 增加 Lacidipine 血中濃度： Cimetidine、Clarithromycin、Erythromycin、葡萄柚汁。
2. 降低 Lacidipine 血中濃度： Phenytoin、Carbamazepine、Rifampicin、St. John's wort (聖約翰草)、phenobarbital。

懷 孕 期： 1.只有對母親的潛在利益超過對胎兒的潛在危險時，才可以在懷孕期內使用本藥。
2.動物試驗結果顯示，懷孕時使用 Lacidipine 並未造成畸形，或損害發育。

授 乳 期： 1.只有對母親的潛在利益超過對新生兒的潛在危險時，才可以在授乳期間內使用本藥。
2. 哺乳婦使用 Lacidipine，可能會使 Lacidipine 分泌至乳汁。