

Bromazepam

【OLEX】Lexotan ( Bropan® ) 3mg/Tab

ATC Code : N05BA08

中文名： 優寧錠 《政德》

適應症： 焦慮狀態。

藥理分類： Benzodiazepine

用法用量： **Administration:** Orally, taken with or without food.

**Dosage regimen:**

Adults, 3-18 mg/day orally in divided doses.

In order to avoid excessive sedation in **the elderly**, the usual adult dose should be reduced by 50% and adjusted according to individual response.

不良反應： 嗜睡、不眠、頭痛、警覺性降低。步行失調、振顫及動作協調力降低。

交互作用：

- **FLUMAZENIL:** may result in precipitation of seizures.
- **BUPRENORPHINE, MORPHINE, CODEINE, TRAMADOL, NALBUPHINE:** ↑ risk of respiratory and CNS depression.
- **CETIRIZINE, LACOSAMIDE, FENTANYL, LEVOCETIRIZINE, METOCLOPRAMIDE, TRAZODONE:** ↑ risk of CNS depression.

注意事項： 1.空腹或與食物一起服用均可。

2.服藥期間應避免心開車或操作危險機械。

懷孕期： 懷孕三個月以內應衡量有益性與危險性而決定使用。妊娠後期會引起新生兒哺乳困難，肌緊張低下、嗜眠、黃疸增強等症狀。分娩前連續使用產後新生兒有禁斷症狀產生。

授乳期： Bromazepam 會分泌至乳汁中，引起嬰兒嗜睡、體重減少現象。