

Edoxaban Tosilate

【OLIXI】Lixiana® F.C. 60mg/Tab

ATC Code : B01AF03

【OLIX3】Lixiana® F.C. 30mg/Tab

ATC Code : B01AF03

中文名：里先安膜衣錠 《台灣第一三共》

適應症：1. 預防非瓣膜性心房纖維顫動合併以下至少一項危險因子之病患發生中風及全身性栓塞。危險因子包括：鬱血性心臟衰竭、高血壓、年齡 ≥ 75 歲、糖尿病、先前曾發生中風或暫時性腦缺血。
2. 在初始5到10日的非經腸道抗凝血藥物治療後，Lixiana可用於治療靜脈栓塞。靜脈栓塞包括深層靜脈栓塞（DVT）及肺栓塞（PE）。

藥理分類：Anticoagulant, Factor Xa Inhibitor; Direct Oral Anticoagulant (DOAC).

用法用量：Administration: orally, taken with or without food.

Indications and dosage regimens:

Prevention of stroke and systemic embolism

— 60 mg QD.

Treatment of DVT, PE

— 60 mg QD following initial use of parenteral anticoagulant for at least 5 days

NVAF and VTE:

30 mg QD in patients with one or more of the following clinical factors:

— Moderate or severe renal impairment (creatinine clearance(CrCL) 15 - 50 mL/min)

— Low body weight ≤ 60 kg

— Concomitant use of the following P-glycoprotein (P-gp) inhibitors: cyclosporine, dronedarone, erythromycin, or ketoconazole.

不良反應：可能有貧血、出血、肝功能指數異常、疹子等。

交互作用：

- Anticoagulants: ↑ the anticoagulant effect of Anticoagulants.
- MiFEPRISone: ↑ the the risk of bleeding may be increased
- RifAMPin: ↓ the serum concentration of Edoxaban, avoid combination.
- Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin, Itraconazole: ↑ concentration of Edoxaban. In patients treated for deep vein thrombosis or pulmonary embolism, **reduce the edoxaban dose to 30 mg daily** when coadministration.

注意事項：1.Lixiana®與抗凝血劑注射治療不應同時使用。
2.可空腹或與食物一起服用。
3.服用本藥期間避免服用阿斯匹靈或其他非類固醇消炎藥（NSAIDs）。
4.出血性手術前需至少停藥24小時。
5.請勿自行突然停藥，以免中風發生風險變高。
6.若有異常出血或瘀青，請盡快就醫。

懷 孕 期：鑑於潛在的生殖毒性、出血風險，以及Lixiana®可通過胎盤的證據，Lixiana®禁止用於懷孕婦女。具有生育能力的女性應避免於接受Lixiana®治療期間懷孕。

授 乳 期：哺乳中的女性服用Lixiana®的安全性及療效尚未確立。動物研究的資料顯示Lixiana®會被分泌至乳汁中。因此禁止於哺乳期間使用。使用者必須在停止哺乳或停用/停止治療之間擇一。