

Megestrol acetate

【OMEGE】 Megest<sup>®</sup> Oral Suspension 40mg/mL, 120mL/Bot

ATC Code : L02AB01

中文名： 麥格斯口服懸液劑 «東洋»

適應症： 後天免疫缺乏症候群患者的厭食症，及後天免疫缺乏症候群患者及癌症患者之惡病體質引起的體重明顯減輕。

藥理分類： **Antineoplastic Agent, Hormone; Appetite Stimulant; Progestin.**

用法用量： **Administration:** orally, taken with or without food. Shake well before using.

**Indications and dosage regimen:**

**Anorexia or cachexia associated with AIDS:**

Initial, 800 mg/day;  
maintenance, 400-800 mg/day

**Cancer-related cachexia:**

160 to 800 mg per day  
higher doses (>160 mg) were associated with more weight gain (*Beller 1997; Loprinzi 1990; Loprinzi 1993; Vadell 1998*)

Safety and effectiveness not established in children.

不良反應： 腹瀉、性無能、紅疹、無力、疼痛等。

注意事項： 1. 空腹或與食物一起服用皆可，請振搖均勻後服用。  
2. 本品不適用於預防體重減輕。  
3. 有血栓性栓塞疾病病史的患者，應謹慎使用。  
4. 糖尿病患者的使用，報告指出糖尿病惡化、胰島素需求量增加與使用本劑有關。

懷 孕 期： 禁用。

授 乳 期： 可能對新生兒有不良影響，因此在麥格斯口服懸液劑治療期間應停止授乳。

儲 存： 使用後請密封避光儲存於 25 °C 以下。

健保規定： 5.3.6. Megestrol 口服液劑：(108/6/1、109/3/1)

1. 限用於已排除其他可治療之體重減輕（如全身性感染、影響吸收的腸胃道疾病、內分泌疾病、腎臟或精神病）之具惡病質的後天免疫缺乏症候群患者及癌症患者。
2. 惡病質之條件包括最近 6 個月以內體重流失>5%，或 BMI<20 且體重流失>2%。