

Procaterol Hydrochloride Hemihydrate

【OMEPT】 Meptin-mini® 25mcg/Tab

ATC Code : R03CC08

中文名： 減喘淨微錠 «臺灣大塚»

適應症： 支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸疾患之氣道閉塞性障礙。

藥理分類： **Intermediate-Acting β_2 adrenoreceptor Agonist.**

用法用量： **Administration:** orally, taken without regard to meals.

Dosage regimen:

Adults: 50 mcg BID or HS

Children: $\geq$ 6 yrs, 25 mcg BID or HS.

< 6 yrs, 1.25 mcg/kg/dose BID or TID.

不良反應： 心悸、心跳過速、顫抖、頭痛、噁心、嘔吐、發疹等。

交互作用：

- Beta-Blockers (Nonselective): ↓ the bronchodilatory effect of Beta2-Agonists.
- Linezolid: ↑ the hypertensive effect of Sympathomimetics.
- Loop Diuretics: ↑ the hypokalemic effect of Loop Diuretics
- Monoamine Oxidase Inhibitors: ↑ the adverse/toxic effect of Beta2-Agonists.
- Theophylline Derivatives: ↑ the adverse/toxic effect of Theophylline Derivatives.

注意事項： 1.飯前或飯後服用均可。

2.本劑會抑制 allergen 引起之皮膚反應，實施皮膚試驗，須在 12 小時前停藥。

懷 孕 期： 對懷孕或可能懷孕婦女投與本劑時，應審慎評估，只有在治療效益大於可能發生的危險時，才可投與本劑。在懷孕期間使用本劑的安全性尚未確立。

授 乳 期： 開始使用本劑前，應停止哺乳。動物試驗中顯示 procaterol 會分泌到乳汁。