

Mercilon

【OMERC】 Mercilon® 21Tab/Box

ATC Code : G03AA09

中文名：美適儂錠 «Organon»

適應症：避孕。

成分： Each tablet contains:
Desogestrel 0.15 mg
Ethinyl estradiol 0.02 mg

藥理分類： **Contraceptive; Progestin and Estrogen Combination.**

用法用量： 1.需每天大約在同一時間依包裝上所指示方向順序服用，若需要可搭配開水一起服用。每日一錠連續服用 21 天。
2.在 7 天停藥間隔後開始服用下 1 盒，這段期間經常會發生停藥性出血。出血情形常在服用最後 1 錠後 2 至 3 天開始，且在下一盒開始服用前可能尚未結束。

不良反應： 乳房腫脹疼痛、泌乳、頭痛、性慾改變、情緒抑鬱、隱形眼鏡不耐症、噁心、嘔吐、陰道分泌改變、體重改變。

注意事項： 漏服藥片的處理原則：

1. 若使用者服用藥錠時間延遲**未超過 12 小時**，避孕效果不受影響，所以只要在想起應該服藥時就立刻補服，下一次就回復正常時間服藥。
2. 若使用者服用藥錠時間延遲**超過 12 小時**，避孕效果可能降低；忘記服藥時，請遵照下列兩項基本規定處理：
 - (1). 服藥絕不可中斷超過 7 日。
 - (2). 必須連續 7 日服藥才能充分抑制下視丘—腦下垂體—卵巢軸。

禁忌： 若有下列任何情形，不可使用複合式荷爾蒙避孕藥(CHCs)：

- (1)存在靜脈血栓栓塞(venous thromboembolism；VTE) 或具有 VTE 風險者。
- (2)存在動脈血栓栓塞(arterial thromboembolism；ATE) 或具有 ATE 風險者。
- (3) 其他情形：
 - 與嚴重高三酸甘油酯症有關之胰臟炎或胰臟炎病史。
 - 出現或曾有嚴重肝病，肝功能指數未恢復正常值。
 - 出現或曾有肝腫瘤(良性或惡性)病史。
 - 已知或懷疑受性類固醇影響的惡性腫瘤(例如：發生於生殖器官或乳房的惡性腫瘤)。
 - 尚未診斷之陰道出血。
 - 已知或疑似懷孕。

懷孕期： 1.懷孕期間不應服用 Mercilon，使用 Mercilon 治療期間，若發現懷孕，應立即停止服藥；
2.大多數的流行病學研究指出，在懷孕前使用 COCs 的婦女其新生兒發生缺陷的風險並不會增加，若懷孕早期不小心使用 COCs 也不會有產生畸形兒的危險。COCs：複合式口服避孕藥(combined oral contraceptives; COCs)

授乳期： 哺乳可能受到 COCs 影響，造成母乳量減少及成份改變；因此，直到母親停止餵哺母乳之前，一般而言，不建議服用 COCs。少量的避孕類固醇及/或其代謝物可能會隨著母乳分泌出來，但無法證實此現象對嬰兒健康會產生不良影響。