

Pravastatin Sodium

【OMEVA】Mevalotin® 40mg/Tab

ATC Code : C10AA03

中文名：美百樂鎮錠 《台灣第一三共》

適應症：高血脂症。冠狀動脈心臟病之初發性預防或再發性預防。

藥理分類：Antilipemic Agent, HMG-CoA Reductase Inhibitor.

用法用量：Administration: orally taken in the evening without regard to meals.

Indications and dosage regimens:

Adult:

- **Hyperlipidemias**, primary prevention of coronary events, secondary prevention of cardiovascular events:
Initial: 40 mg QD; **MAX dose:** 80 mg/day.
- Prevention of cardiovascular disease/reduce the risk of **ASCVD**:
40 mg QD.

Pediatric:

- Heterozygous familial hypercholesterolemia (HeFH):
Children and Adolescents 8 to 13 years: 20 mg QDy.
Adolescents 14 to 18 years: 10~40 mg QD.

Immunosuppression therapy (concomitant cyclosporine):

Initial, 20 mg once daily; maintenance, **MAX** 40 mg/Day

Safety and efficacy not established in children <8 yr.

- 交互作用：
1. Cyclosporine、fibrate 衍生物、erythromycin、colchicine、protease inhibitor、fusidic acid：↑發生肌病的危險性。
 2. 紅麴類食品（紅麴含有天然的 statin）：↑體內 statin 含量，影響肝功能。
 3. Coumarin 類抗凝血劑：會顯著的增加正在服用病人之 INR。
 4. RifAMPin: ↑ the serum concentration of Pravastatin. (仿單).
RifAMPin may **decrease** the serum concentration of Pravastatin. (UpToDate, 2023)

不良反應：噁心、倦怠、肌肉病變、肝功能異常、皮疹。

- 注意事項：
1. 中至重度腎功能不全或明顯肝功能不全病人的建議起始劑量為每日 10mg。
 2. 本劑禁用於活動性肝疾病或 Transaminase 不明原因持續上升之患者。
 3. 應指導患者，如果出現不明原因的肌肉疼痛、壓痛或肌肉無力，尤其是伴隨身體不適或發燒，必須立即告訴醫師。

懷 孕 期：禁用。

授 乳 期：禁用。由於 HMG-CoA 還原酶抑制劑可能造成哺乳中嬰兒的不良反應，因此如同其他的 HMG-CoA 還原酶抑制劑，禁止用於孕婦及授乳中的母親。