

Gliclazide

【OMEZ3】 Gliclax® SR 30mg/Tab

ATC Code : A10BB09

中文名：糖立清持續釋放錠 «永信»

適應症：成人型糖尿病。

藥理分類：Antidiabetic Agent, Sulfonylurea.

用法用量：**Administration: orally**, with breakfast; swallow whole tablet, should not be crushed or chewed.

Initially, 30-120 mg/day; MAX 120 mg/day.

不良反應：低血糖症（冒冷汗、心悸、頭痛、痙攣、昏亂）、發燒、喉嚨痛、皮膚疹、黃疸症狀等。

注意事項：1.建議與早餐一起服用。整顆吞服。
2.避免大量飲酒(因酒會延長低血糖作用)。

禁忌：1.對 Gliclazide 或本藥其他成分、sulphonylureas 或 sulphonamides 類藥物過敏者。
2.酮酸中毒、糖尿病昏迷前期及昏迷
3.嚴重性腎臟或肝臟功能異常。

注意事項：1.本劑不建議使用於嚴重腎功能不全患者。
2.肝臟疾病者應降低劑量。
3.本品項不宜磨粉或嚼碎。

懷孕期：1.懷孕期間不建議使用口服降血糖藥，建議改用胰島素。
2. Gliclazide is contraindicated for use during pregnancy.
3. Agents other than gliclazide are currently recommended to treat diabetes mellitus in pregnancy (ADA 2020).

授乳期：1.治療中不要哺乳。
2. It is not known if gliclazide is present in breast milk.
Use is **contraindicated** in breastfeeding mothers.