Gliclazide

[OMEZ3] Gliclax® SR 30mg/Tab ATC Code: A10BB09

中文名: 糖立清持續釋放錠 《永信》

適應症: 成人型糖尿病。

藥理分類: Antidiabetic Agent, Sulfonylurea.

用法用量: Administration: orally, with breakfast; swallow whole tablet, should not be crushed

or chewed.

Dosage regimen:

Initially, 30-120 mg/day; **MAX dose:** 120 mg/day.

不良反應: 低血糖症(冒冷汗、心悸、頭痛、痙攣、昏亂)、發燒、喉嚨痛、皮膚疹、黃

疸症狀等。

注意事項: 1.建議與早餐一起服用。整顆吞服。

2.避免大量飲酒(因酒會延長低血糖作用)。

禁 忌: 1.對 Gliclazide 或本藥其他成分、sulphonylureas 或 sulphonamides 類藥物過敏者。

2.酮酸中毒、糖尿病昏迷前期及昏迷

3.嚴重性腎臟或肝臟功能異常。

注意事項: 1.本劑不建議使用於嚴重腎功能不全患者。

2.肝臟疾病者應降低劑量。

3.本品項不宜磨粉或嚼碎。

懷 孕 期: 1.懷孕期間不建議使用口服降血糖藥,建議改用胰島素。

2. Gliclazide is contraindicated for use during pregnancy.

3. Agents other than gliclazide are currently recommended to treat diabetes mellitus

in pregnancy (ADA 2020).

授 乳 期: 1.治療中不要哺乳。

2. It is not known if gliclazide is present in breast milk.

Use is **contraindicated** in breastfeeding mothers.