

## Magnesium Oxide

【OMGO】Magnesium Oxide 250mg/Tab

ATC Code : A06AD02

中文名： 氧化鎂錠 «景德»

適應症： 軟便。

藥理分類： **Electrolyte Supplement, Oral; Magnesium Salt**

用法用量： **Administration:**

Orally, taken at least 2 hours apart from other medications.

### Indications and dosage regimens:

#### Antacid:

— Adults & Children  $\geq$  12 yr,  
300-900 mg TID, 1 hour before meals.

— Children,  
75-225 mg TID, 1 hour before meals.

#### Laxative:

##### Adults,

900-1800 mg BID before meals and at bedtime.

不良反應： 不愉快味道、腹瀉等。

交互作用：

- **MgO:** ↑ the adverse/toxic effect of Calcium (Sodium) Polystyrene Sulfonate.
- **Alfacalcidol, Calcitriol:** ↑ the serum concentration of Magnesium Salts.
- **Bisphosphonate, Levothyroxine, Quinolones, Tetracycline:** ↓ the serum concentration of these drugs.
- **Gabapentin:** ↑ the CNS depressant effect of Gabapentin.

注意事項：

1. 腎功能不佳之患者，須慎防高血鎂症發生。
2. 有胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心情形，請勿使用。
3. 配合醫師指示使用，勿超過建議使用量。
4. 若用於幫助排便，一旦排便正常，即應停藥。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。

懷 孕 期： 資料不足。鎂會通過胎盤。

授 乳 期： 安全性未知。