

28:36.20.08 Nonergot-derivative Dopamine Receptor Agonists

Pramipexole

【OMIR3】Mirapex® P.R. 0.375mg/Tab

ATC Code : N04BC05

中文名：樂伯克持續性藥效錠 0.375 毫克 《百靈佳般格翰》

【OMIR5】Mirapex® P.R. 1.5mg/Tab

ATC Code : N04BC05

中文名：樂伯克持續性藥效錠 1.5 毫克 《百靈佳般格翰》

適應症：治療巴金森氏症的徵候及症狀。

藥理分類：Anti-Parkinson Agent, Dopamine Agonist.

用法用量：Administration: orally, taken with or without food.

Indications and dosage regimens:

Parkinson disease:

Initial: 0.375 mg once daily; increase by 0.375 mg every 5 to 7 days based on response and tolerability.

Usual dose: 1.5 to 4.5 mg once daily;

Maximum: 4.5 mg once daily.

Dosage adjustment in renal impairment:

CrCl >50 mL/minute: No dosage adjustment necessary.

CrCl 30 to 50 mL/minute: Initial: 0.375 mg every other day; may increase to 0.375 mg once daily no sooner than 1 week after initiation. If necessary, may increase by 0.375 mg per dose not more frequently than every 7 days;

Maximum recommended dose: 2.25 mg once daily

CrCl <30 mL/minute: Use not recommended.

ESRD requiring hemodialysis: Use not recommended.

不良反應：暈眩、嗜睡或失眠、便秘、無力、姿勢性低血壓。

交互作用：

- **Metoclopramide:** ↓ the therapeutic effect of Pramipexole.
- Pramipexole may ↓ the therapeutic effect of **Antipsychotic Agents (First Generation [Typical]):** *Chlorpromazine, Flupentixol, Haloperidol, Prochlorperazine*. Antipsychotic Agents (First Generation [Typical]) may ↓ the therapeutic effect of Pramipexole.
- **Antipsychotic Agents (Second Generation [Atypical]):** *OLANzapine, Risperidone, Sulpiride*: ↓ the therapeutic effect of Pramipexole.

注意事項：1.可於飯前或飯後服用。若出現噁心症狀，可將 Mirapex® P.R.錠劑與食物一起服用，可能有助減少噁心的發生。整粒服用，不可剝半、磨粉或咀嚼。
2.不可突然減量或停藥。服本藥治療期間不可飲酒。
3.腎功能不良者須調整劑量。
4.由坐或臥姿起身時請徐緩，以避免姿勢性低血壓發生
5.本藥可能會引起頭昏或嗜睡，避免開車或進行需警覺性及協調能力之活動。

懷 孕 期：尚未在懷孕婦女進行有良好對照組的適當研究。僅在可能的益處超過對胎兒的可能風險時，才可在懷孕期間使用 Mirapex® P.R.。

授 乳 期：目前並不清楚此藥物是否會從人類乳汁分泌。pramipexole 在哺乳嬰兒可能引發嚴重的不良反應，因此必須在考量此藥物對母親的重要性之後，決定是否中斷哺乳或中斷用藥。