

Amizide (Amiloride HCl, Hydrochlorothiazide)

【OMOD】 Moduretic (Amizide[®]) 50mg/Tab

ATC Code : C03EA01

中文名：安立壓錠 《生達化學》

適應症：利尿、高血壓。

成 分：Each tablet contains:

Amiloride HCl 5 mg

Hydrochlorothiazide 50 mg

藥理分類：Diuretics, Combination; Antihypertensive.

用法用量：**Administration:** orally, taken with food.

Dosage regimens:

One tablet daily, may increase to 2 tablets daily.

Maximum daily dose: 4 tablets/day.

Safety and efficacy not established in children.

不良反應：食慾不振、噁心、潮紅、眩暈、頭痛、疲倦無力等。

交互作用：

- ARBs, ACEIs: ↑ the hyperkalemic effect.
- Antipsychotic Agents (Second Generation [Atypical]): ↑ hypotensive effect.
- Cardiac Glycosides: ↓ the therapeutic effect of Cardiac Glycosides.

注意事項：1.建議白天服用，與食物一起服用。

2.避免由坐姿或躺臥時突然站立，易產生暈眩。

3.服藥期間避免喝酒，避免日曬過久。

禁 忌：下列情形避免服用--

1.血清鉀濃度超過 5.5 mEq/L。

2.已在服用抗排鉀療法藥物或補充鉀鹽。

3.血中 BUN 值超過 30 mg/dL 或血中尿素值超過 60 mg/dL。

懷孕期：可通過胎盤，不可用於孕婦。

授乳期：可分泌至乳汁。接受本藥治療期間停止授乳。