

Mosapride Citrate Dihydrate

【OMOZ】Mopride (Mozapry®) 5mg/Tab

ATC Code : A03FA09

中文名：胃默適錠 «中化»

適應症：消化器官蠕動機能異常引起之不適症狀，包括心窩灼熱、噁心、嘔吐。

藥理分類：Gastrointestinal Agent, Prokinetic.

用法用量：Safety and efficacy not established in children.

Administration: orally taken without regard to meals.

Dosage regimen:

Adults, 5 mg orally 3 times daily.

交互作用：1.Mosapride 主要利用 CYP3A4 進行代謝，當與其它會影響 CYP3A4 活性的藥物一起服用時，會使 mosapride 在體內的濃度改變。

2.Anticholinergics 藥品會抑制 mosapride 的作用，應注意投與時間間隔。

不良反應：腹瀉、軟便、口渴、倦怠感及噁心。

注意事項：1.飯前或飯後服用均可。

2.本藥品與心臟節律藥物併用時應注意監測其心電圖，如有心律不整之情形發生時，應予減少使用劑量或停藥。

懷 孕 期：對孕婦或是有可能懷孕的婦女，應在判斷投藥治療的效益遠超過危險性時，才能開具此藥。(因為本品對懷孕中婦女的安全性尚未經證實)

授 乳 期：哺乳中的婦女避免使用本品，若不得不使用時，應要求該婦女暫停授乳。