

Nebivolol

【ONEB】 Nebilet® 5mg/Tab

ATC Code : C07AB12

中文名： 耐比洛錠 5 毫克 «Menarini»

適應症： 治療原發性高血壓。

藥理分類： Beta-Blocker, Beta-1 Selective; Antihypertensive.

用法用量： Safety and efficacy not established in children.

Administration: Orally, taken with or without food.

Indication and dosage regimen:

Hypertension:

Initial: 5 mg QD; titrate as needed at 2-week intervals based on patient response to a **Maximum** dose of 40 mg QD.

Dosage adjustment:

CrCl <30 mL/minute:

Initial: 2.5 mg once daily, titrate cautiously to 5mg daily as needed.

Moderate hepatic impairment (Child-Pugh class B):

Initial: 2.5 mg once daily, titrate cautiously.

Severe hepatic impairment (Child-Pugh class C): Use is **contraindicated**.

In Geriatric Patients (>65yrs, <75yrs):

Initial: 2.5 mg once daily, titrate cautiously to 5mg daily as needed.

不良反應： 頭痛、頭暈、疲倦、便秘、噁心、腹瀉、呼吸不順暢。

交互作用：

- DRONEDARONE: **increased** incidence of bradycardia.
- VERAPAMIL, DILTIAZEM: hypotension, bradycardia.
- CYP2D6 inhibitors (BUPROPION, FLUOXETINE, PAROXETINE, SERTRALINE, DULOXETINE, MOCLOBEMIDE): ↑ exposure to nebivolol.
- RIVASTIGMINE: additive bradycardic effects.

注意事項：

1. 空腹服用或與食物併服皆可。
2. 糖尿病患者應注意，因為可能會掩蓋低血糖的某些症狀（心跳過快、心悸）。
3. $Cl_{cr} < 30$ mL/min 或中度肝功能不全病患，自低劑量開始使用。嚴重肝功能不全病患，不建議使用。
4. 沒有醫師指示，勿任意改變服用劑量。並且不要突然中斷使用，原則上要逐漸減少用量(約 2 星期)。特別是有冠狀動脈疾病者應特別注意。
5. 本藥品含有乳糖。半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏症、半乳糖吸收異常 (glucose-galactose malabsorption) 的患者，不應服用本藥。
6. 下列病患**不建議**使用本藥：
 - 1) 肝功能不全或受損者。
 - 2) 急性心衰竭、心源性休克或正處於心臟衰竭，喪失代償能力期間必須靜脈注射強心劑以增加其功能者。
 - 3) 病態性竇房症候群(Sick sinus syndrome)，包括竇房傳導阻斷。
 - 4) 第二級或第三級房室傳導阻斷（無心臟節律器）。
 - 5) 支氣管痙攣和支氣管氣喘病史者。
 - 6) 未經治療的嗜絡細胞瘤。
 - 7) 代謝性酸中毒。
 - 8) 心跳過慢（治療前心跳速率 <60 bpm）。
 - 9) 嚴重末梢循環障礙。

懷孕期：

1. 可能會對孕婦、胎兒/新生兒產生影響。除非必要，不應於懷孕期間使用。
2. Exposure to beta-blockers during pregnancy may increase the risk for adverse events in the neonate.

3. If maternal use of a beta-blocker is needed, fetal growth should be monitored during pregnancy and the newborn should be monitored for 48 hours after delivery for bradycardia, hypoglycemia, and respiratory depression.

授乳期： 不建議於授乳期使用本藥。