

Niflec Powder

【ONIFL】Niflec Powder® 137.155g/包

ATC Code : A06AD10

中文名：耐福力散 «中化»

適應症：大腸內視鏡檢查及大腸手術前淨腸。

成分：Each gm contains:

Sodium chloride	21.36 mg
Potassium chloride	10.83 mg
Sodium bicarbonate	24.57 mg
Sodium sulfate anhydrous	82.9 mg

溶解液的電解質濃度(每袋 137.155 gm 溶成 2 L 時)：

離子	Na ⁺	K ⁺	Cl ⁻	HCO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻
濃度 mEq/L	125	10	35	20	80

藥理分類：Cathartic; Laxative, Bowel Evacuant.

用法用量：取本品 137.155 gm (一袋)以水溶成約 2 公升溶解後使用。通常成人 1 次約須使用 2~4 公升，以每小時約 1 公升的速度經口服方式投藥。一直到排泄液變透明時為止，最多不要超過 4 公升。

大腸內視鏡檢查之前處理：檢查當天的早餐須禁食(只可以攝取水份)，檢查預定時間開始前約 4 小時左右開始投與。

大腸手術的前處理：手術前 1 天午餐吃過後，開始禁食(只可以攝取水份)午餐過後約經過 3 個小時，開始投與。

不良反應：嘔吐、嘔氣，噁心、反胃、腹鳴。

注意事項：1.以下患者請勿投與：(1)胃腸管閉塞者。(2)腸管穿孔。(3)中毒性巨大結腸症。
2.有狹心症，習慣性心肌梗塞的患者，因偶爾會有胸痛現象發生應慎重投與。
3.有腎機能障礙的患者，因偶爾出現嘔吐現象，應慎重投與。
4.溶解後儘速使用，若不能繼續使用，請冷藏保存，並於 48 小時內使用。
5.每次以杯子裝約 200 mL 之溶解液，大約以 1 公升/小時之速度，經口投與。
通常，大約投與 1 公升後，就開始排便。此後仍繼續給與本品，直到排泄液大致上呈透明為止，但以 4 公升為限。

懷 孕 期：對於妊娠中婦女投藥之安全性尚未確立，因此對於孕婦或可能正在懷孕的婦女，只有在有益性大於危險性時才投與。

授 乳 期：無安全性相關資料。