

Olmesartan Medoxomil

【OOLM】 Olmetec[®] 20mg/Tab

ATC Code : C09CA08

中文名： 雅脈膜衣錠 20 毫克 《台灣第一三共》

適應症： 高血壓。

藥理分類： **Angiotensin II Receptor Blocker; Antihypertensive.**

用法用量： **Administration:** orally, administer with or without food.

Dosage regimen:

Initial, 20 mg QD; after 2 weeks, may titrate to 40 mg QD.

Note: No additional therapeutic benefit with higher dosages or with twice-daily dosing.

Dosage adjustment:

Kidney Impairment: Adult--

- CrCl \geq 40 mL/minute: No dosage adjustment necessary.
- CrCl <40 mL/minute: No initial dosage adjustment necessary.
- CrCl <20 mL/minute:
 - ◇ AUC is increased 3-fold and
 - ◇ Maximum dose of 20 mg/day.

Hepatic Impairment: Adult

- Mild impairment: No dosage adjustment necessary.
- Moderate to severe: No initial dosage adjustment necessary. Total drug exposure increased ~60% in moderate impairment.

Safety and efficacy not established in children.

不良反應： 眩暈、低血壓、腹瀉、頭痛、疲倦等。

交互作用： 本品不會被細胞色素 P450 系統代謝，也對 P450 酵素無反應作用。

注意事項： 1. 飯前或飯後服用均可；避免經常食用含鉀代鹽。
2. 禁止合併使用 Olmetec[®] 及含 aliskiren 成份藥品於糖尿病病人或腎功能不全病人(GFR<60 ml/min/1.73 m²)。

懷 孕 期： 1. **[US Boxed Warning]: Drugs that act on the renin-angiotensin system can cause injury and death to the developing fetus. When pregnancy is detected, discontinue as soon as possible.**

2. 避免使用。發現懷孕時，應儘早停止使用 Olmetec[®]。

授 乳 期： 因為有潛在不良反應，應考量對母親的重要性決定是否停止哺乳或停用藥物。目前仍未知 Olmesartan 是否會經乳汁分泌。