

Ticlopidine HCl

【OPAND】Menchuan® 100mg/Tab

ATC Code : B01AC05

中文名： 免栓膜衣錠 «瑞士»

適應症： 適用於曾發生完成性栓塞型中風（Completed Thrombotic Stroke）及有中風前兆（Stroke Precursors），且不適用於使用 Aspirin 之患者；及不能忍受 Aspirin 的慢性阻塞性動脈疾病。

藥理分類： **Antiplatelet Agent, Thienopyridine; P2Y12 Antagonist.**

用法用量： **Administration:** orally, taken with food.

Dosage regimen :

Adults, 200-500 mg/day in 2-3 divided doses.

不良反應： 皮疹、發燒及喉痛、不尋常出血、瘀青或出血、腹痛。

注意事項：

- 1.禁用於出血、嚴重肝病、白血球減少患者。
- 2.對於初次使用本劑之患者，應於開始用藥之初及3個月內，每2週檢測一次全血球計數（CBC）及白血球分類（white cell differentials），治療過程中若病人發生感染時，則應隨時檢測全血球計數及白血球分類。
- 3.服用本劑者應定期檢查血液及肝功能。
- 4.接受手術前10-14天應停藥。

交互作用：

- Agents with **Antiplatelet** Properties (e.g., P2Y12 inhibitors, NSAIDs, SSRIs, etc.): ↑ the antiplatelet effect of Ticlopidin.
- **Anticoagulants:** ↑ the anticoagulant effect of Anticoagulants.
- **Theophylline** Derivatives: ↑ concentration of Theophylline Derivatives.
- **TiZANidine:** ↑ the serum concentration of TiZANidine.
- **Vitamin E** (Systemic): ↑ the antiplatelet effect of Ticlopidine.

懷 孕 期：

- 1.動物試驗曾有母體出血紀錄，孕婦最好不要使用。
- 2.Teratogenic effects have not been observed in animal reproduction studies; a case report has demonstrated the safe use of ticlopidine in pregnant women (Ueno 2001).

授 乳 期：

- 1.不建議使用。
2. It is not known if ticlopidine is excreted in breast milk.
- 3.Due to the potential for serious adverse reactions in the nursing infant, a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of treatment to the mother.

給付規定： 全民健保藥品給付規定：

- 1.限無法忍受 aspirin，或對 aspirin 有禁忌而需使用抗血小板製劑之病患使用。
- 2.原則上 ticlopidine 與 acetylsalicylic acid 不宜合併使用，僅於冠狀動脈支架植入術後3個月內，得依病情需要合併使用。
- 3.申報費用時須註明放置支架(stent)之日期。