

Rabeprazole

【OPARI】Pariet® E.F.C. 20mg/Tab

ATC Code : A02BC04

中文名：百抑潰腸溶膜衣錠 «衛采»

【ORABE】Rabett® E.F.C. 20mg/Tab

ATC Code : A02BC04

中文名：胃潰樂腸溶膜衣錠 «元宙»

適應症：胃潰瘍、十二指腸潰瘍、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌相關的消化性潰瘍、胃食道逆流疾病之治療。

藥理分類：**Proton Pump Inhibitor.**

用法用量：**Administration:**

- Swallow whole; do not crush, split, or chew; taken with or without food.
- Take the tablet in the morning before eating if once daily.

Indications and dosage regimens:

Gastroesophageal Reflux (GERD):

— **GERD Without Erosive Esophagitis:**

20 mg QD x 4 weeks; may be given additional 4 weeks if symptoms are not completely resolved.

— Treatment of **Erosive Esophagitis:**

20 mg QD x 4-8 weeks. If not healed after 8 weeks, consider additional 8 weeks of therapy (up to 16 weeks for a single course).

— Maintenance of Healing of **Erosive Esophagitis:**

20 mg QD. Chronic, lifelong therapy may be appropriate.

Duodenal Ulcer:

— Active Duodenal Ulcer:

20 mg QD for up to 4 weeks; some patients may require additional therapy.

— *Helicobacter pylori* Infection and Duodenal Ulcer:

20 mg QD x 7 days in conjunction with amoxicillin and clarithromycin.

Pathologic GI Hypersecretory Conditions:

60 mg QD. Dosages up to 100 mg QD or 60 mg BID have been used. Has been used continuously for up to 1 year.

不良反應：頭痛、腹瀉、噁心。

交互作用：

- CLOPIDOGREL: ↓ antiplatelet activity.
- Cellcept®: ↓ exposure to mycophenolic acid (MPA).
- METHOTREXATE: ↑ risk of methotrexate toxicity.
- DIGOXIN: ↑ risk of digoxin toxicity (nausea, vomiting, arrhythmias).
- ERLOTINIB, CAPECITABINE, GEFITINIB: ↓ in exposure of these drugs.

注意事項：1. 本品為腸溶錠，不宜嚼碎或壓碎，應整顆吞服。

2. 一日服用一次時，建議在每日早上飯前服用。

※儘管一日中的給藥時間以及食物之攝取均不會對 rabeprazole sodium 的活性產生任何影響，但此種療法可提高病人對治療的服從性。

3. 對於有肝或腎功能障礙的病人，不需要特別調整劑量。

懷 孕 期： 目前對於懷孕婦女，尚無充分且良好對照之臨床研究，且上市後經驗非常有限。惟有經評估潛在效益大於對胎兒的潛在風險時，方可於懷孕期間使用

授 乳 期： 不建議使用。目前尚未知 rabeprazole sodium 是否會在人體乳汁中分泌。但 rabeprazole sodium 會在老鼠乳腺中被分泌出來，因此不建議在授乳期中使用。

**全民健保藥品給付規定：依「消化性潰瘍用藥限制使用規定」辦理