

Piracetam

【ONOO】Noopol (Knowful®) 400mg/Cap

ATC Code : N06BX03

中文名：腦福膠囊 «永信»

適應症：對腦血管障礙及老化所引起之智力障礙可能有效。

【OPIRA】Piracetam (Syntam® Granules) 2400mg/Sachet

ATC Code : N06BX03

中文名：郝智內服溶液用顆粒劑 «健喬信元»

適應症：1.腦血管障礙及老化所引起之智力障礙可能有效。
2.皮質性陣發性抽搐之輔助療法。

藥理分類：Antimyoclonic, Miscellaneous; Nootropic.

用法用量：Administration:

Capsule, granule: orally, with food or without food. Pour the granules into about 50 ml of cold water and stir well before drink.

Indications and dosage regimens:

Cerebrovascular insufficiencies & age-associated cognitive impairment:

Loading dose: 4.8 g daily during initial week of treatment;
maintenance, 1.2-2.4 g/day.

Cortical myoclonus:

Initially, 7.2 g/day, increasing by 4.8 g/day every 3 or 4 days up to a maximum at 24 g/day, taken in divided doses (2 or 3 times daily).

不良反應：頭痛、痙攣、暈眩、錐體外症狀及胃腸道症狀(噁心、嘔吐、厭食、下痢、便秘、及胃痛)。

交互作用：

- Piracetam may ↑ the anticoagulant effect of Urokinase, Enoxaparin, Heparin.
- Piracetam may ↑ the antiplatelet effect of Clopidogrel, Prasugrel, Acemetacin, Aspirin, Dipyridamole, Etodolac, Ibuprofen, Indomethacin, Ketoprofen, Ketorolac, Mefenamic Acid, Meloxicam, Naproxen, Piroxicam, Sulfinpyrazone, Ticagrelor, Ticlopidine, Tirofiban, Venlafaxine, Fluoxetine, Paroxetine, Citalopram, Sertraline, Piracetam, Cilostazol.

注意事項：1.針劑給藥途徑--靜脈或肌肉注射皆可。
2.口服劑型--可空腹或與食物一起服用皆可。
3.顆粒--使用前先將袋內顆粒倒入約 50cc 冷開水中溶解後服用。
4.若發生眩暈，請不要開車或使用危險機械。
5.由於 piracetam 經由腎排泄，腎機能不全者須特別注意。

禁忌：嚴重腎臟機能不全者禁用。

懷孕期：Piracetam 會通過胎盤。除非必要，懷孕期間不應使用 piracetam。

授乳期：Piracetam 會滲入乳汁。授乳期間應避免使用本品或治療期間應停止授乳。