

K-Stone Granules (Potassium Citrate, Citric acid)

【OPOTA】 K-Stone Granules® 5g/Sachet

ATC Code : G04BC

中文名： 利石通顆粒 《羅得》

適應症： 鹼化劑（用於需長期保持尿鹼性之場合，如尿道結石、腎小管性酸毒症。）

成分： Each g contains:

Potassium citrate 660 mg (Potassium Citrate 30.5 mEq/Tab)

Citric acid 200 mg

藥理分類： **Alkalinizing Agents, Oral.**

用法用量： One sachet of potassium citrate granules mixed with 180 mL of cool water or juice, ORALLY after meals and at bedtime.
Adults, 1 sachet 4 times daily.

禁忌： 1.嚴重腎障礙伴隨尿少症或氮血症者，2.未治療之 Addison's 症者、3.Adynamia episodica hereditaria 急性脫水、4.熱痙攣、5.嚴重心肌損害及任何原因引起之高鉀血症者禁用。

不良反應： 腎功能正常及排尿量正常者，於一般劑量下無不適之副作用。但對腎機能不正常者，可能會引起高鉀血或鹼中毒症狀，如無精打彩、神志昏眩、不安及其他伴隨血中高濃度鉀所引起之症狀。

注意事項： 1.每一包請加 180cc 冷開水或果汁混勻後服用。
2.本品含高濃度的鉀，必須先加水稀釋後再服用，以減少對胃腸道之傷害，且於飯後服用可避免造成緩瀉作用。
3.同時使用含鉀藥物，鉀滯留之利尿劑及強心配醣體者，須謹慎使用。
4.應定期檢測血中電解質含量，以避免副作用產生。

懷 孕 期： 小心使用。

Animal reproduction studies have not been conducted.

授 乳 期： 小心使用。

Potassium is excreted into breast milk. The normal potassium ion content of human milk is ~13 mEq/L. It is not known if this product may affect normal concentrations.

使用規定： 全民健保藥品給付規定---

限泌尿道結石或腎小管性酸毒症病人使用。