

Mequitazine

【OPRIA】Mequitazine 5mg/Tab

ATC Code : R06AD07

中文名：過敏美奎錠 «五洲»

適應症：乾草熱、過敏性鼻炎、蕁麻疹、溼疹、血管神經性水腫、季節性結膜炎、藥物過敏。

藥理分類：Histamine H1 Antagonist, First Generation; Phenothiazine Derivatives.

用法用量：Administration:

Orally, taken without regard to meals.

Dosage regimen:

Adults & Children > 12 yrs: 5 mg BID

不良反應：口乾、視力模糊、思睡、倦怠、胃腸不適，在剛開始服用期間偶爾會發生。

交互作用：

- **Azelastine (Nasal)** : ↑ the CNS depressant effect of Mequitazine.
- CYP2D6 Inhibitors (**DULoxetine, Mirabegron**, Terbinafine): ↑ the serum concentration of Mequitazine.
- **Erythromycin** (Systemic) : ↑ arrhythmogenic effect of Mequitazine. IV erythromycin is specifically contraindicated with mequitazine.
- **Glycopyrrolate** (Oral Inhalation): ↑ anticholinergic effect of Glycopyrrolate .
- **Ipratropium** (Oral Inhalation) : ↑ the anticholinergic effect of Mequitazine.
- MAOIs(**Linezolid, Methylene Blue**): ↑ anticholinergic effect of Mequitazine.
- **Moxifloxacin** (Systemic) : ↑ the arrhythmogenic effect of Mequitazine.

注意事項：1.癲癇、前列腺肥大、青光眼與肝病患者應謹慎使用。
2.飯前或飯後服用均可。勿併服含酒精飲料。
3.本品不可與 MAOIs 並用。
4.服用此藥後，勿駕車或操作危險器械。

懷 孕 期：孕婦不建議使用本品。

授 乳 期：無授乳安全性資料。