

Finasteride

【OPROP】Propecia® 1mg/Tab

ATC Code : D11AX10

中文名： 柔沛膜衣錠 «MSD»

適應症： 雄性激素造成的禿頭。

藥理分類： **5 Alpha-Reductase Inhibitor.**

用法用量： **Administration:** May be administered with or without meals.

Note:

*Pregnant patients and patients who could become pregnant **should not** touch or handle crushed or broken tablets.*

Dosage regimen:

1 mg QD for more than 3 months.

Note:

Continue for at least 12 months to assess full effect; continued daily use is required to sustain benefit.

不良反應： 性慾減低、 難以勃起、 射精量減少。

交互作用：

- ST JOHN'S WORT : ↓ plasma exposure and ↑ metabolism and clearance of finasteride.

注意事項： 1. 飯前或飯後服用均可。
2. 婦女及兒童禁用本劑。
3. 肝功能異常者應小心使用本劑。
4. 建議應持續使用，以維持效益，並定期再評估。中斷治療後，會在 12 個月之內消失原本之效果。
5. 如果胸部出現任何如腫塊、疼痛或乳頭排出液體這類的變化，就應立即回報。胸部的變化還包括胸部脹大和觸痛。

懷 孕 期： 1. Finasteride 禁用於孕婦或可能懷孕的婦女。
2. 已經懷孕或可能懷孕的婦女不應碰觸壓碎或破損的 Propecia®錠劑，因為可能會吸收 finasteride，之後並可能造成對男性胎兒的潛在危險性。

授 乳 期： 尚未知 finasteride 是否會排入乳汁中，且本品不適用於婦女。

備 註： 本品健保不給付。