

Qtern (Saxagliptin 5 mg, Dapagliflozin 10 mg)

【OQTE】 Qtern<sup>®</sup> 5/10 mg/Tab

ATC Code : A10BD21

中文名： 控糖穩膜衣錠 «AstraZeneca»

適應症： 用於下列第二型糖尿病患者:當 metformin 和 Qtern 中之單一成分無法達到充分的血糖控制時，以改善血糖控制；已使用 dapagliflozin 和 saxagliptin 的自由組合治療時。

成分： Each tablet contains:  
Dapagliflozin .....10 mg, Saxagliptin..... 5mg

藥理分類： Antidiabetic Agent, Sodium-Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) Inhibitor; Dipeptidyl Peptidase 4 (DPP-4) Inhibitor.

用法用量： **Administration:** Orally, taken once daily in the morning, with or without food.  
Swallow tablets whole; do not crush, cut, or chew tablets.

**Dosage regimen:**

1 tab once daily in the morning.

**Dosage adjustment in Renal Impairment:**

eGFR  $\geq$ 45 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>: No dosage adjustment necessary.

**eGFR <45 mL/minute/1.73 m<sup>2</sup>: Use is contraindicated.**

**ESRD: Use is contraindicated.**

**Hemodialysis: Use is contraindicated.**

**Dosage adjustment in hepatic Impairment:**

No dosage adjustment necessary; use with caution in severe impairment (has not been studied).

Safety and efficacy not established in children < 18 yr.

不良反應：泌尿道感染、鼻咽炎、上呼吸道感染、關節痛、腹瀉、血脂異常。

交互作用：

1. CYP3A4 inhibitors (Ketoconazole, clarithromycin, itraconazole, ritonavir) : ↑ Saxagliptin exposure. **Management:** limit the saxagliptin dose to 2.5 mg daily when combined with strong CYP3A4 inhibitors. When using the saxagliptin combination products saxagliptin/dapagliflozin or saxagliptin/ dapagliflozin/ metformin, avoid use with strong CYP3A4 inhibitors.
2. FLUOROQUINOLONES : ↑ risk of hypoglycemia or hyperglycemia.
3. HYDROXYCHLOROQUINE: may result in hypoglycemia.

注意事項：1、腎絲球過濾率估計值 (eGFR) 低於 45 mL/min/1.73 m<sup>2</sup> 的病人，不應使用 Qtern<sup>®</sup>。

2、與其他血糖用藥併用須注意低血糖問題。

懷 孕 期：不建議在懷孕第二孕期和第三孕期時使用 Qtern<sup>®</sup>。

授 乳 期：因為 Qtern<sup>®</sup>可能對接受哺乳的嬰兒造成嚴重的不良反應(包括 Dapagliflozin 可能影響出生後的腎臟發育)，不建議在哺乳期間使用。

健保規定：1.每日限處方 1 粒。

2.限用於已接受過最大耐受劑量的 metformin，且併用 dapagliflozin 或 saxagliptin 治療至少 6 個月，糖化血色素值(HbA1c)仍高於 7.5%者。