

92:28 Cariostatic Agents

Risedronate Sodium

【OREOS】 Reosteo® 150 mg/Tab

ATC Code: M05BA07

中文名：瑞骨卓膜衣錠 «Pharmascience»

適應症：治療及預防停經後婦女之骨質疏鬆症。

藥理分類：**Bisphosphonate Derivative.**

用法用量：**Administration:**

- Administer **on an empty stomach** with a full glass (6 to 8 oz) of plain water (not mineral water) ≥ 30 minutes before any food, drink, or other medications orally to avoid interference with absorption.
- Patient must **remain sitting upright or standing for ≥ 30 minutes** after taking (to reduce esophageal irritation).
- Tablet should be **swallowed whole**; do not crush or chew.

Dosage regimen:

one tablet taken once a month

不良反應：噁心、腹瀉、便秘、類流感症狀、背痛或關節疼痛。

交互作用：

- ESOMEPRAZOLE, RABEPRAZOLE, LANSOPRAZOLE, OMEPRAZOLE, PANTOPRAZOLE, FAMOTIDINE may result in **increased** risedronate bioavailability.
- CALCIUM, IRON: may result in **decreased** risedronate absorption.

注意事項：1.每月口服一次，服藥當日早上起床後，第一餐前空腹至少 30 分鐘以上，保持上半身直立姿勢以一整杯冷開水(約 200 cc)整粒吞下（勿嚼碎或吸吮），服藥後半小時內不得躺下。

2.鈣片、制酸劑、其它口服藥、飲料及食物，應於服藥後半小時以上才可服用。

3.有嚴重腎功能障礙（肌酐廓清率 $< 30\text{mL/min}$ ）之患者不建議使本品。

4.指導病患於服藥後，若發生胸口痛或吞嚥困難應告知醫師。

5. 若飲食中攝取不足，應另補充鈣與維生素 D。

懷 孕 期：目前仍無針對懷孕婦女實施適當且控制良好的臨床研究。僅於對母親與胎兒作完優缺點評估後，才可以決定懷孕期是否使用 Risedronate Tablet。

授 乳 期：人乳中是否會分泌 risedronate 則不得而知。由於有許多藥品會自人乳中分泌出來，以及 bisphosphonate 類藥品對哺育人乳的嬰兒可能有嚴重的副作用，病患應決定停止授乳，或停止服藥。

健保規定：1.限用於停經後婦女因骨質疏鬆症引起脊椎或髖部骨折，或因骨質疏少症引起脊椎或髖部 2 處或 2 次(含)以上之骨折。

2.治療時，一次限用一項藥物，不得併用其他骨質疏鬆症治療藥物。

3.使用雙磷酸鹽類藥物，須先檢測病患之血清 creatinine 濃度，符合該項藥物仿單之建議規定。