

Rifampin , Isoniazide

【ORIF15】 Rifinah® 150mg S.C. Tablets

ATC Code : J04AM02

中文名： 樂肺寧糖衣錠 «Sanofi»

成分： Each Tablet contains:

Rifampin 150 mg, INAH 100 mg

【ORIFI】 Rifinah® 300mg S.C. Tablets

ATC Code : J04AM02

中文名： 樂肺寧糖衣錠 «Sanofi»

成分： Each Tablet contains:

Rifampin 300 mg, INAH 150 mg

適應症： 肺結核、奈瑟氏腦膜炎球菌帶原者。

藥理分類： Antitubercular Agent.

用法用量： **Administration:** orally, taken on an empty stomach (30 minutes before or 2 hours after meals.)

Indications and dosage regimens:

Adults

Body weight $\geq$ 50 kg : Rifinah® 300 $\times$ 2 tablets QD

Body weight < 50 kg : Rifinah® 150 $\times$ 3 tablets QD

不良反應： 尿液變紅、胃腸不適、昏睡感、頭痛、肌肉痛。

交互作用：

- Rifamycin 會增加肝臟對皮質類固醇(corticosteroid)代謝酶的活性(此交互作用會在停用 rifampin 後 2~3 週才能回復正常)，臨床上應盡量避免同時使用上述藥品，否則在 rifampin 維持 300/day 劑量下，corticosteroids 的劑量至少需增加一倍以上才能維持相同療效。
- Paxlovid® : ↓ Paxlovid® concentration.
- Vemlidy® (Tenofovir alafenamide) : ↓ tenofovir alafenamide exposure, loss of therapeutic effect, and increased risk of resistance.
- Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban, Ticagrelor: ↑ risk thromboembolic events.
- Hydroxychloroquine: ↓ efficacy of hydroxychloroquine.
- Exemestane, Nifedipine, Digoxin, Lamotrigine, Amiodarone, Mycophenolate mofetil: ↓ exposure.

注意事項： 1. Rifinah 應於空腹(餐前至少 30 分鐘或餐後 2 小時)服用。
2.若治療中斷後再度服用本劑時，須小心過敏反應之發生。
3.服用本藥期間尿液及糞便會成棕紅或橘紅色，不要配戴隱形眼鏡。
4.不建議使用 Rifinah 於兒童病人。

懷 孕 期： Rifinah 尚未針對孕婦做過良好的對照性研究，因此醫師對孕婦或可能懷孕者需加衡量利弊才可使用。

授 乳 期： 已知 rifampicin 及 isoniazid 會進入母體乳汁。因此，哺乳的母親只有在 Rifinah 對病人的潛在利益大於其對嬰兒的風險時才能使用。