

Semaglutide

【ORY3】Rybelsus® Tab 3mg

ATC Code : A10BJ06

【ORY7】Rybelsus® Tab 7mg

ATC Code : A10BJ06

【ORYB】Rybelsus® Tab 14mg

ATC Code : A10BJ06

中文名： 瑞倍適錠 3 毫克、瑞倍適錠 7 毫克、瑞倍適錠 14 毫克 «Novo Nordisk»

適應症： 搭配飲食及運動療法，用於治療血糖控制不良的第二型糖尿病成人病人，以改善血糖控制。

藥理分類： Antidiabetic Agent, Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) Receptor Agonist.

用法用量： **Administration:**

- Orally taken on an **empty stomach**, **≥30 minutes before** the first food, beverage, or other oral medications of the day with ≤4 oz of plain water only.
- The manufacturer recommends eating 30 to 60 minutes after the dose.
- **Swallow tablets whole**; do not split, crush, or chew.

Indications and Dosage regimens:

- **Diabetes mellitus, type 2**, treatment:

Initial: 3 mg QD for 30 days, then increase to 7 mg QD; may increase to 14 mg QD after 30 days on the 7 mg dose if needed to achieve glycemic goals.

Daily max dose: 14mg

Missed dose: Missed dose should be skipped; resume at the next scheduled dose.

Note: The lower initial dose (3 mg daily) is intended to reduce GI symptoms; it does not provide effective glycemic control.

Safety and efficacy not established in children < 18 yrs

不良反應： 噁心、嘔吐、腹瀉、消化不良、食慾減低、低血糖(與磺醯脲類藥物或胰島素時併用時)。

交互作用：

- Beta-Blockers: ↑ the hypoglycemic effect of Antidiabetic Agents. Symptoms of hypoglycemia, particularly tachycardia, may be also be blunted. Beta-Blockers may diminish the therapeutic effect of Antidiabetic Agents.
- Furosemide: ↓ the therapeutic effect of Semaglutide. Semaglutide may increase the serum concentration of Furosemide.
- Hydroxychloroquine: may result in hypoglycemia.
- MAO Inhibitors: ↑ the hypoglycemic effect.
- SSR Inhibitors: ↑ the hypoglycemic effect.

注意事項：

1. 禁用於個人或是家族有 MTC (甲狀腺髓質癌) 病史患者及第 2 型多發性內分泌腫瘤綜合症患者 (MEN2)。
2. 本藥品應**空腹服用**，可在一天中任何時間服藥。應搭配少量的水 (最多半杯，相當於 120 毫升) 整顆吞服。錠劑不應剝開、壓碎或咀嚼，因為尚不清楚是否會影響 semaglutide 的吸收。病人服藥後應等待至少 30 分鐘再進食、喝水或服用其他口服藥物。等待時間少於 30 分鐘會降低 semaglutide

的吸收。

3. 每日一次的最大建議劑量為 14 mg。服用兩顆 7 mg 的錠劑以達到 14 mg 的效果尚未經過研究，因此不建議此服用方式。
4. 併用磺醯脲類藥物或胰島素時，可考慮調降磺醯脲類藥物或胰島素的劑量，以減少低血糖風險。
5. 如果漏掉一劑，則應跳過，第二天再服用下一劑。
6. 輕微、中度或重度腎功能不全的病人不需調整劑量，semaglutide 用於重度腎功能不全病人的經驗有限。不建議用於末期腎病的病人。
7. 肝功能不全的病人不需調整劑量，semaglutide 用於重度肝功能不全病人的經驗有限。
8. 接受 semaglutide 治療的病人，胃腸道副作用可能導致脫水的風險，並注意避免體液不足。
9. 本藥品每顆錠劑的鈉含量為 23 mg。

懷 孕 期： 建議有生育能力的女性在接受 semaglutide 治療時，需採用避孕措施。
授 乳 期： 由於無法排除哺乳嬰幼兒的風險，哺乳期間不應使用 semaglutide。
儲 存： 存放於原鋁箔片包裝中，避免光線照射或受潮。本藥品請存放於 30°C 以下。
使用規定： 目前此三項皆為自費品項。(111/07)