

Vigabatrin

【OSAB】 Sabril® 500mg/Tab

ATC Code : N03AG04

中文名： 赦癲易膜衣錠 «Sanofi»

適應症： 抗癲癇之輔助療法：與其他抗癲癇藥併用，治療具有或無續發全身性（with or without Secondary generalization）頑強性部分癲癇（resistant partial epilepsy）病人，並使用過其他之合併藥物，經證實不適當或無法忍受者。

藥理分類： **Anticonvulsant, Miscellaneous.**

用法用量： **Administration:** Administer orally once or twice daily without regard to meals.

Dosage regimens:

Adults:

- Initially, 1 g daily should be added to the patient's current anti-epileptic drug regimen.
- Increased by 0.5 g at weekly intervals.
- MAX 3 g/day.

Children: Initially, 40 mg/kg/day.

Bodyweight (kg)	Maintenance Dose
10-15	0.5-1.0 g/day
15-30	1.0-1.5 g/day
30-50	1.5-3.0 g/day
50	2.0-3.0 g/day

不良反應： 視野障礙(VFD，發生率約 1/3)、嗜眠、疲倦、不能集中注意力、精神激昂(孩童)等。

交互作用：

- Concurrent use with ORLISTAT: **reduced** anticonvulsant effectiveness.
- CARBAMAZEPINE: carbamazepine toxicity (ataxia, nystagmus, diplopia, headache, vomiting, apnea, seizures, coma).
- CALCIFEDIOL: altered serum levels of calcifediol.

注意事項：

1. Sabril 不應以單獨治療（monotherapy）方式給藥。
2. 本品不適用於 6 歲以下孩童。
3. 服用 vigabatrin 之患者常有輕微至嚴重不等之視野障礙(visual field defects, VFD)的報告，通常於治療數月至數年後才會出現。由 vigabatrin 造成之視野障礙，即使停藥，也無法恢復。因此，本品僅能在小心評估其與其他治療方法之間的利益與風險後方能使用。

懷 孕 期： 尚未有針對懷孕婦女使用 Vigabatrin 所設計的適當且控制良好的臨床研究。只有在絕對必要時，才能於懷孕期間使用 Vigabatrin。

授 乳 期： Vigabatrin 會經由母乳分泌。Vigabatrin 治療期間不建議餵食母乳。

使用規定： 全民健保藥品給付規定：限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇 發作之輔助性治療(add on therapy)。