

Dihydroergotamine Mesylate

【OSEGL】Seglor (Lesiton®) 5mg/Cap

ATC Code : N02CA01

中文名：樂息痛膠囊 «瑞士»

適應症：偏頭痛。

成分： Each capsule contains:
Immediate release 1.5 mg
Programmed release 3.5 mg

藥理分類： **Antimigraine Agent; Ergot Derivative.**

作用機轉： Attributed to the activation of 5-HT_{1D} receptors located on intracranial blood vessels resulting in vasoconstriction and/or activation of 5-HT_{1D} receptors on sensory nerve endings of the trigeminal system resulting in the inhibition of pro-inflammatory neuropeptide release.

用法用量： **Administration:** Orally, taken with meals.
Dosage regimen:
Adults, 1 cap BID with meals.
Liver disease: dose reductions are suggested.

不良反應： 噁心、手指和腳趾感覺異常。

交互作用： 1. macrolide antibiotics (spiramycine 除外)：有發生伴有四肢嚴重壞死的麥角中毒(ergotism)的危險。(減少肝臟內麥角生物鹼的排除)(抑制肝臟內麥角生物鹼(ergot alkaloids)的代謝)。
2. ritonavir、indinavir、nelfinavir、delavirdine、efavirenz 和 lopinavir：有發生伴有四肢嚴重壞死的麥角中毒(ergotism)的危險。(抑制肝臟內麥角生物鹼的代謝)。
3. almotriptan、frovatriptan、naratriptan、rizatriptan、sumatriptan 和 zolmitriptan：有高血壓和冠狀動脈血管緊縮的危險。在 triptan 停藥後，可以間隔 24 小時後再投與本生物鹼。
4. voriconazole, triclabendazole：有四肢嚴重壞死的麥角中毒(ergotism)的危險(抑制肝臟內麥角生物鹼的代謝)。triclabendazole 停藥後，可以間隔 24 小時後再投與其他生物鹼衍生物，順序反過來也可以。
5. 避免與 bromocriptine、lisuride、carbergoline、pergolide、ephedrine、phenylpropanolamine、pseudo-ephedrine 並用，因有發生血管緊縮及血壓驟升之危險。

注意事項： 1. 空腹服用本劑可能引起腸胃不適症狀。
2. 用餐時服用，配水整粒吞服，不宜磨粉使用。

懷孕期： 在使用高劑量下，可能造成子宮收縮。因此，**盡可能不要在懷孕期間投與 dihydroergotamine。**

授乳期： 目前並無關於 dihydroergotamine 是否會滲透入乳汁的資料，危險性未知：因此 dihydroergotamine 用藥期間**不建議授乳。**