

Amlodipine, Olmesartan

【OSEVI】Sevikar 5/40[®] Tablet

ATC Code : C09DB02

中文名：舒脈康膜衣錠 5/40 《台灣第一三共》

適應症：高血壓，此複方藥品不適合用於起始治療。

成分：Each tablet contains:

Amlodipine 5 mg

Olmesartan 40 mg

藥理分類：Calcium Channel Blocker; Angiotensin II Receptor Blocker.

用法用量：**Administration:** orally, taken without regard to meals.

Dosage regimens:

1. 適用於以 Amlodipine 或 olmesartan 單方無法獲得血壓有效控制的病人。
2. Sevikar[®] 通常的起始劑量為 5/20 mg，每天一次。治療 2 週後，可根據需要將劑量增加為每天一次 10/40 mg 一錠之最高劑量，以控制血壓。
3. 使用 2 週後可增加劑量 (Sevikar[®] 5/40 毫克及 Sevikar[®] 10/40 毫克)。
4. Sevikar[®] 的最高建議劑量是 10/40 mg。

Max dose:

Amlodipine: 10mg/day

Olmesartan: 40mg/day

Safety and efficacy not established in children.

交互作用：詳細內容請參閱 Norvasc[®] 及 Olmetec[®] 項下內容。

Amlodipine---

1. ↑ amlodipine 血中濃度：ketoconazole、itraconazole、ritonavir、cimetidine、clarithromycin、grapefruit(juice)。
2. ↓ amlodipine 血中濃度：Carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, rifampicin、St. John's wort (聖約翰草)。
3. Simvastatin, Lovastatin: ↑ statins serum level and ↑ myopathy.
4. Clopidogrel: ↓ antiplatelet effect and ↑ risk of thrombotic events.

Olmesartan---

1. 本品不會被細胞色素 P450 系統代謝，也對 P450 酵素無反應作用。
2. ACEIs: ↑ risk of adverse events (ie, hypotension, syncope, hyperkalemia, changes in renal function, acute renal failure).
3. FUROSEMIDE: may result in severe hypotension and deterioration in renal function, including renal failure.
4. LITHIUM: ↑ risk of lithium toxicity.
5. TRIMETHOPRIM: ↑ risk of hyperkalemia.
6. POTASSIUM: ↑ risk of hyperkalemia.

不良反應：水腫、低血壓、腹瀉、眩暈、頭痛、疲倦等。

注意事項：1. 若發現懷孕，應立即停用 Sevikar[®]。
2. 體液不足及／或鹽份不足型病人(例如接受高劑量利尿劑治療者)，開始接受 olmesartan medoxomil 治療後，可能發生有症狀的低血壓。

- 懷孕期：**
1. 若發現懷孕，應立即停用 Sevikar[®]。服用直接作用於腎素—血管收縮素系統的藥物，可能傷害發育中胎兒甚至造成死亡。
 2. **[US Boxed Warning]: Drugs that act on the renin-angiotensin system can cause injury and death to the developing fetus. When pregnancy is detected, discontinue as soon as possible.**
- 哺乳期：** 目前並不確定 Sevikar[®]的成份是否會分泌至人類乳汁。由於此藥物可能導致接受哺乳的嬰兒產生不良反應，應考慮藥物對母親的重要性，決定是否停止哺乳或停用藥物。