

Amlodipine, Olmesartan

【OSEVI】Sevikar 5/40[®] Tablet

ATC Code : C08CA01

中文名：舒脈康膜衣錠 5/40 《台灣第一三共》

適應症：高血壓，此複方藥品不適合用於起始治療。

成分：Each tablet contains:

Amlodipine 5 mg

Olmesartan 40 mg

藥理分類：Calcium Channel Blocker; Angiotensin II Receptor Blocker.

用法用量：**Administration:** orally, taken without regard to meals.

Dosage regimens:

1. 適用於以 Amlodipine 或 olmesartan 單方無法獲得血壓有效控制的病人。
2. Sevikar[®] 通常的起始劑量為 5/20 mg，每天一次。治療 2 週後，可根據需要將劑量增加為每天一次 10/40 mg 一錠之最高劑量，以控制血壓。
3. 使用 2 週後可增加劑量 (Sevikar[®] 5/40 毫克及 Sevikar[®] 10/40 毫克)。
4. Sevikar[®] 的最高建議劑量是 10/40 mg。

Max dose:

Amlodipine: 10mg/day

Olmesartan: 40mg/day

Safety and efficacy not established in children.

- 交互作用：
1. Simvastatin 與 amlodipine 併用會增加 simvastatin 的全身暴露量。使用 amlodipine 治療的病人，併用 simvastatin 的劑量上限為每日 20 mg。
 2. Amlodipine 與 CYP3A 抑制劑 (如 fluconazole、itraconazole、ketoconazole、voriconazole、clarithromycin、erythromycin、cyclosporine、diltiazem、grapefruit、indinavir、ritonavir、saquinavir) 併用時，會導致 amlodipine 的全身暴露量增加，可能需要降低劑量。

不良反應：水腫、低血壓、腹瀉、眩暈、頭痛、疲倦等。

- 注意事項：
1. 若發現懷孕，應立即停用 Sevikar[®]。
 2. 體液不足及／或鹽份不足型病人 (例如接受高劑量利尿劑治療者)，開始接受 olmesartan medoxomil 治療後，可能發生有症狀的低血壓。

- 懷孕期：
1. 若發現懷孕，應立即停用 Sevikar[®]。服用直接作用於腎素-血管收縮素系統的藥物，可能傷害發育中胎兒甚至造成死亡。
 2. **[US Boxed Warning]: Drugs that act on the renin-angiotensin system can cause injury and death to the developing fetus. When pregnancy is detected, discontinue as soon as possible.**

哺乳期：目前並不確定 Sevikar[®] 的成份是否會分泌至人類乳汁。由於此藥物可能導致接受哺乳的嬰兒產生不良反應，應考慮藥物對母親的重要性，決定是否停止哺乳或停用藥物。