

Olmesartan, Amlodipine, Hydrochlorothiazide

【OSEVIH】Sevikar HCT® 40/5/12.5 Tablet

ATC Code : C09DX03

中文名：舒脈優膜衣錠 «台灣第一三共»

適應症：治療高血壓。本品適用於以 Olmesartan、Amlodipine、Hydrochlorothiazide 其中兩種成分合併治療，仍無法有效控制血壓的高血壓病患。

成分：Each tablet contains:

Olmesartan ..... 40 mg, Amlodipine ..... 5 mg, Hydrochlorothiazide .....12.5 mg

藥理分類：Angiotensin II Receptor Blocker; Calcium Channel Blocker; Thiazide Diuretic.

用法用量：**Note:** Not for initial therapy. Dose is individualized; combination product may be substituted for individual components in patients currently maintained on all 3 agents separately or in patients not adequately controlled with any 2 of the following antihypertensive classes: Calcium channel blockers, angiotensin II receptor blockers, and diuretics.

**Administration: orally**, taken with or without food.

**Indication and dosage regimen:**

**Hypertension:**

**Add-on/switch/replacement therapy:**

Amlodipine 5-10 mg, olmesartan 20-40 mg, and hydrochlorothiazide 12.5-25 mg once daily; dose may be titrated after 2 weeks of therapy.

**Maximum recommended daily dose:**

Amlodipine 10 mg, olmesartan 40 mg, hydrochlorothiazide 25 mg

**禁忌：** 1. 因為含有 hydrochlorothiazide 的成份，無尿症(anuria)或對其他磺胺類藥物過敏的病患不得使用 Sevikar HCT®。  
2. 不建議合併 Sevikar HCT®與 aliskiren 於糖尿病病患。

**注意事項：** 1. 空腹或飯後服用皆可，於固定時間服用。  
2. 無尿，曾對本藥任一成分或磺胺類藥品過敏者不可服用本藥。  
3. 充足飲水。  
4. 授乳、懷孕或預備懷孕者不宜使用，用藥前請先告知醫師。  
5. 服藥後可能會頭暈，避免開車或操作危險器械。

**不良反應：** 周邊水腫、頭痛、疲倦、噁心、上呼吸道感染、腹瀉、尿道感染。

**交互作用：** 1. Simvastatin 與 amlodipine 併用會增加 simvastatin 的全身暴露量。使用 amlodipine 治療的病人，併用 simvastatin 的劑量上限為每日 20 mg。  
2. Amlodipine 與 CYP3A 抑制劑(如 fluconazole、itraconazole、ketoconazole、voriconazole、clarithromycin、erythromycin、cyclosporine、diltiazem、grapefruit、indinavir、ritonavir、saquinavir)併用時，會導致 amlodipine 的全身暴露量增加，可能需要降低劑量。

**懷孕期：** 若發現懷孕，應立即停用 Sevikar®。服用直接作用於腎素－血管收縮素系統的藥物，可能傷害發育中胎兒甚至造成死亡。

**授乳期：** ● 目前並不確定 amlodipine 或 olmesartan 成份是否會分泌至乳汁中。但 thiazides 確定會分泌至乳汁中，且在泌乳的大鼠乳汁內可觀察到低劑量的 olmesartan。  
● 由於此藥物可能導致接受哺乳的嬰兒產生不良反應，所以應考慮藥物對母親的重要性後，決定是否中斷哺乳或停用藥物。