

Nicorandil

【OSIG】 Sigmart[®] 5mg/Tab

ATC Code : C01DX16

中文名：喜革脈錠 «中外製藥»

適應症：狹心症。

藥理分類：Antianginal Agent; Vasodilator.

用法用量：**Administration:** Orally, administer without regard to meals.

Indication and dosage regimen:

5 to 20 mg twice daily or

5 mg three times daily

Nicorandil does not require dose adjustment in renal impairment.

不良反應：頭痛、噁心/嘔吐、眩暈、顏面潮紅、心悸、倦怠。

禁忌：請勿與含下列成分藥品併用：Sildenafil citrate (如 Viagra[®])、Vardenafil(如 Levitra[®])、Tadalafil(如 Cialis[®])。因併用時，會加強本劑的降壓效果，而使血壓過度下降。

注意事項：1.對於嚴重肝障礙者、青光眼患者及高齡患者應謹慎投與。
2.本錠劑在服用初期，具有和其他硝酸鹽、亞硝酸鹽類藥物同樣的血管擴張作用，有可能導致搏動性的頭痛，此時可減少劑量或停止使用。
3.G6PD (glucose 6 phosphate dehydrogenase)缺乏者應謹慎投與。

懷孕期：對孕婦用藥的安全性尚未得以證實，故對孕婦及有可能懷孕的婦女請勿使用。

授乳期：安全性未知。