

Di octahedral Smectite

【OSME】Smecta® 3g/Sachet

ATC Code : A07BC05

中文名：舒腹達口服懸液用粉劑 «法商益普生, IPSEN»

適應症：急性和慢性腹瀉的治療。

藥理分類：Antidiarrheal agents; an intestinal Adsorbent.

用法用量：**Administration:** Orally; each sachet mixed with 50 mL water or semi-liquid.

Dosage regimens:

Adults and Children > 2 yrs: 1 sachet TID.

1-2 yrs: 1-2 sachets/day in 3 doses.

< 1 yr: 1 sachet/day in 3 doses.

不良反應：便秘等。

注意事項：

1. 舒腹達並非補液治療，不能替代補液療法，脫水病例應適當補充液體。
2. **成人**：服藥前，需將每袋藥粉與半杯水混勻後服用。
兒童：每袋內之藥粉可與 50ml 開水混勻或與半流質：果汁、肉湯、嬰兒食品…混勻，再依醫師指示的劑量餵服。
一歲以下嬰兒：加入奶瓶中與 50cc 水混勻後分成三次或依醫師指示服用。
3. 本品的吸附作用可能干擾其他藥物的吸收與排除，應盡量避免與其他藥品同時使用，如需服用其他藥物，**建議與舒腹達間隔至少 2 小時以上**。
4. 若連續服用 7 天後症狀仍未緩解，須就醫。
5. 果糖不耐受症、葡萄糖和半乳糖吸收不良患者不建議使用本品。本品含葡萄糖及蔗糖。

懷 孕 期：安全性尚未確立。本品不會被吸收，隨糞便排出。

授 乳 期：安全性尚未確立。本品不會被吸收，隨糞便排出。