

Chlorzoxazone

【OSOL】 Solaxin® 200mg/Tab

ATC Code : M03BB03

中文名： 舒肉筋新錠 «衛采»

適應症： 肌肉緊張症、急性腰痛、脊椎間板症候群及脊髓炎痙攣、神經肌肉之機能異常等所伴生有肌痙攣、強直之諸疾患。

藥理分類： Skeletal Muscle Relaxant.

用法用量： **Administration:** orally, taken with or without food.

Indications and dosage regimens:

Muscular Conditions:

— Initially, 200 mg 3-4 times daily; if response inadequate, increase dosage to 400 mg 3-4 times daily. When desired response is obtained, reduce dosage to lowest effective level.

— Usual adult dosage: 200-400 mg 3-4 times daily.

Safety and efficacy not established in children.

交互作用：

- Buprenorphine, barbiturates, gabapentin: ↑ risk of respiratory depression.
- Metoclopramide: ↑ risk of CNS depression.
- Meperidine, codeine, morphine: ↑ risk of respiratory or CNS depression.

不良反應： 頭暈、嗜睡、噁心、嘔吐。

注意事項： 1.服用期間，有時尿液會呈橙色或紅紫色。
2.開車或操作危險機器時應小心。
3.飯前或飯後服用均可。

懷 孕 期： 尚無相關安全資料。判斷益處高於風險時才使用本品。

授 乳 期： 本品不建議用於授乳婦。(仿單)